

《高能物理与核物理》

1993—1997 年

作者目次

本刊编辑部

A

- 艾小白 初步的纯光子谱的物理蕴含 21(1997)926
安宇 推广的 Thomas-Fermi 方法中适用的新式核密度 安宇等 2 人 20(1996)324
安竹 22MeV 质子在 ^{28}Si 上弹性及非弹性散射微观分析 19(1995)873

B

- 白鸽 高能不等核碰撞和弛豫时间的 Fokker-Planck 方程描述 白鸽等 3 人 17(1993)57
高能不等核碰撞和弛豫时间的相对论动力论方程描述 白鸽等 2 人 18(1994)166
在弛豫时间近似下 QGP 中夸克输运系数的一种计算 白鸽等 2 人 19(1995)898
关于 QGP 中夸克屏蔽位势来自动力论方程的研究 白鸽等 2 人 20(1996)801
QGP 中夸克静电电波的辐射研究 白鸽等 2 人 21(1997)1011
白光治 大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116
白景芝 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 e/π 识别的 dE/dx 方法在北京谱仪 τ 重轻子质量测量中的应用 荣刚等 6 人 17(1993)865
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
白铭复 $R(5)$ 群 Casimir 算子对核子 JT 耦合态的进一步分类 陈健华等 4 人 19(1995)424
白新华 入射能量为 5.1MeV 中子 $^{58}\text{Ni}(n, \alpha)^{55}\text{Fe}$ 反应截面和出射粒子角分布测量 唐国有等 6 人
19(1995)223
轻核结构的微观计算 白新华等 2 人 21(1997)235

- 轻核中中子间的对相互作用和中子晕 白新华等 2 人 21(1997)932
- 白兴平 $^{16}\text{O} + ^{\text{nat}}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
- 白占武 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 包景东 有限温度下多维裂变速率的量子修正 包景东等 3 人 17(1993)362
- 三维裂变速率的量子角动量效应 17(1993)544
- 裂变扩散方程的协变性 18(1994)263
- 包尚联 中子诱发 $^{233,235,238}\text{U}$ 裂变机制的多通道理论研究 樊铁栓等 3 人 20(1996)422
- 鲍诚光 对称性对三体系统结构的影响 阮文英等 2 人 18(1994)74
- 对称性对四体系统结构和内部运动的影响 阮文英等 2 人 18(1994)454
- ^{12}C 基态和低激发态微观结构的对称性分析 解文方等 2 人 19(1995)848
- 对称性对总自旋为 $1/2$ 的三费米体系结构的影响 解文方等 2 人 20(1996)92
- 边强 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 卞建国 QCD 中等时方程的赝标介子解 卞建国等 2 人 18(1994)127
- 关于夸克凝聚和混合凝聚平移不变性的讨论 18(1994)534
- 单胶子交换梯形近似下 Bethe-Salpeter 方程赝标解 卞建国等 2 人 18(1994)591
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 硅酸铋 (BSO) 晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

C

- 蔡敦九 $(n, 2n)$ 反应同质异能态截面比 黄小龙等 2 人 21(1997)453
- 蔡鹏飞 $(2+1)$ 维 $SU(2)$ 格点规范场胶球质量的解析计算 惠 萍等 3 人 20(1996)55
- 蔡喜臣 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- 蔡延瑛 极端丰中子核 ^{11}Li 软巨偶极共振的研究 17(1993)839
- 巨共振激发的相对论效应 周宝森等 3 人 19(1995)840
- 核介质中核子-核子散射截面的 BHF 微观计算 蔡延瑛等 3 人 20(1996)945
- 蔡 薇 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
- 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
- 蔡 勳 单粒子半单举快度分布的 Cluster 效应 张 阳等 2 人 17(1993)822
- 高能诱导核反应中的核碰撞几何与末态粒子的间歇行为 王海桥等 2 人 18(1994)235
- 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- 重味展开下的 0^- 重介子束缚态 杨纯斌等 2 人 19(1995)327
- BNL / AGS 10.74 GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 同位旋守恒对奇异性产生的约束 杨纯斌等 3 人 20(1996)991
- 曹建华 快中子在 Li 核上的弹性散射微分截面 张 坤等 5 人 19(1995)879
- 曹培园 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486
- 超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
- 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
- 曹义刚 用 Technicolor 理论研究稀有辐射衰变 $B_c \rightarrow D_s^* \gamma$ 鲁公儒等 4 人 21(1997)413
- Technicolor 模型下 QCD 对衰变 $B \rightarrow X\tau\nu_\tau$ 的修正 鲁公儒等 4 人 21(1997)897
- $b \rightarrow s\gamma$ 在 Multiscale Walking Technicolor 模型中的研究 鲁公儒等 4 人 21(1997)1005

- 曹 臻 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
甚高能区宇宙线流强气象效应的分析 贾焕玉等 3 人 18(1994)788
宇宙线超高能相互作用的 QCD 部分子模型产生器 曹 臻等 2 人 18(1994)961
超高能软强子作用的 Chou-Yang 模型 曹 臻等 2 人 18(1994)990
- 柴 勇 Z^0 能区正负电子湮没强子多重数分布的近泊松形式与肩状结构 谢一冈等 2 人 18(1994)778
- 柴正维 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 常 进 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
- 畅祥云 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 晁 明 J/ψ 衰变过程的矩分析和两种坐标系的比较 沈齐兴等 3 人 21(1997)408
- 巢志瑜 北京正负电子对撞机(BEPC)4W1A 光束线光束中心监测与 X 光激发荧光信噪比的观测
洪 蓉等 5 人 17(1993)403
同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
- 陈宝秋 自治的相对论微观光学位研究 17(1993)345
相对论平均场方法研究远离 β 稳定线核的性质 陈宝秋等 2 人 18(1994)371
N-N 关联和有限核相对论平均场方法 陈宝秋等 3 人 19(1995)852
- 陈冰青 原子核的配对壳模型及数值计算(I) 赵玉民等 3 人 21(1997)356
- 陈 昌 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
- 陈朝清 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 陈炽庆 中子与 α 相互作用的两体等效可分离势 裘志洪等 5 人 17(1993)845
- 陈端保 硅光电二极管作为 CsI(Tl) 晶体读出元件的实验研究 何景棠等 5 人 20(1996)890
CsI(Tl) 晶体的辐照损伤研究 何景棠等 5 人 21(1997)21
硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 陈鄂生 高能 e^+e^- 湮没中长寿带电粒子的产额 17(1993)252
非饱和势模型关于 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q} \rightarrow h's$ 的 Monte-Carlo 模拟 王 群等 3 人 18(1994)902
在 $p\bar{p}$ 反应中的夸克对产生率、奇异抑制因子和重子介子比 陈鄂生等 2 人 19(1995)612
- 陈奋策 夸克-胶子等离子体对高能 $p\bar{p}(p)$ 碰撞多重产生的可能描述 19(1995)637
- 陈 峰 集团蒙特卡罗方法对一维量子 X-Y 模型的研究 季达人等 4 人 19(1995)42
- 陈凤至 $SU(23)$ 大统一模型 17(1993)222
一种包括三代费米子的统一模型 陈凤至等 2 人 19(1995)513
- 陈 刚 用神经网络方法鉴别 τ 的强子衰变 陈国明等 2 人 19(1995)692
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 陈光培 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+\tau^- \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^+\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\psi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961

- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 陈国明** 北京谱仪主漂移室的径迹重建 毛泽普等 5 人 17(1993)193
 用神经网络方法鉴别 τ 的强子衰变 陈国明等 2 人 19(1995)692
- 陈和生** L3 中心径迹室顶点位置分辨的改进 杨长根等 5 人 18(1994)687
 L3 实验测量 τ 寿命的拟合方法及其误差讨论 杨长根等 5 人 18(1994)794
- 陈洪** 有限温度 $U(1)$ 格点规范模型的高阶累积展开之研究 郑希特等 4 人 17(1993)1076
 格点定模 $SU(2)$ -Higgs 模型的解析计算 郑希特等 4 人 19(1995)137
 非奇异重子谱的非微扰效应 陈洪等 2 人 20(1996)937
- 陈宏芳** 多丝室工作于自猝灭流光模式下定位特性的研究 陈宏芳等 5 人 17(1993)582
 倾斜多丝正比室辐射状阴极条感应电荷重心读出的定位性能研究 汪兆民等 4 人 17(1993)685
 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm}\pi^{\mp}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 气体雪崩过程中光电信号的时间关联 许咨宗等 4 人 19(1995)775
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 气体雪崩放电的单光子测量时间谱 韩家祥等 5 人 20(1996)885
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 在 BES 实验中用神经网络法鉴别 e, μ, π 张子平等 4 人 21(1997)297
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 闪烁光纤光传输特性的研究 汪晓莲等 7 人 21(1997)787
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 陈佳洱** RF 超导腔低温测量原理 沮栋林等 2 人 20(1996)663
 直线对撞机用的 RF 超导多胞加速腔和陷阱模研究 沮栋林等 2 人 21(1997)180
- 陈健华** $R(5)$ 群 Casimir 算子对核子 JT 耦合态的进一步分类 陈健华等 4 人 19(1995)424
- 陈建新** 中子与 α 相互作用的两体等效可分离势 裘志洪等 5 人 17(1993)845
- 陈江川** 从高山乳胶室族事例研究强相互作用在碎裂区的特征 陈江川等 4 人 19(1995)494

- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 陈金全** 关于“不可约性假设的证明及其应用”一文的评注 赵玉民等 2 人 21(1997)121
- 原子核的配对壳模型及数值计算 (I) 赵玉民等 3 人 21(1997)356
- 原子核的配对壳模型数值计算 (II) 赵玉民等 2 人 21(1997)438
- 陈金象** 入射能量为 5.1 MeV 中子 $^{58}\text{Ni}(n, \alpha)^{55}\text{Fe}$ 反应截面和出射粒子角分布测量 唐国等有 6 人 19(1995)223
- 陈锦华** ^{252}Cf 冷裂变瞬发 γ 射线 韩洪银等 4 人 19(1995)8
- 陈军峰** 强子的内部激发和 QCD 真空在核物质的热力学行为上的效应 贺泽君等 4 人 17(1993)1126
- 陈克良** $^{16}\text{O} + ^{34}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
- $600\text{MeV}^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
- 非全熔合反应裂变角分布 刘国兴等 4 人 21(1997)777
- 陈 昆** 背景场中夸克模型的味无关轴矢流 陈 昆等 2 人 17(1993)114
- 陈乐君** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 陈列文** 重离子反应中核子前平衡发射的同位旋效应 陈列文等 3 人 20(1996)1091
- 中能重离子反应中“neck”的形成和碎裂 陈列文等 3 人 21(1997)1018
- 陈 林** 核上 $A(\pi, \eta)X$ 单举反应 陈 林等 2 人 18(1994)553
- 陈玲燕** 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
- 陈 敏** Z_b Belavin 模型的反射矩阵 陈 敏等 3 人 20(1996)794
- 陈启洲** 带 Wilson 费米子的格点 Schwinger 模型中 $\langle\psi\psi\rangle$ 的变分研究 许国材等 3 人 17(1993)1011
- 2 + 1 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的红外形式 陈启洲等 4 人 18(1994)37
- 带有质量的 Wilson 费米子的格点 Schwinger 模型中 M_ψ 对 m 的变化率的计算 江俊勤等 3 人 18(1994)222
- 2 + 1 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的研究 陈启洲等 4 人 18(1994)417
- 2 + 1 维 $SU(3)$ 格点纯规范场的真空态计算 陈启洲等 3 人 19(1995)398
- (2 + 1) 维 $SU(2)$ 真空波函数四级近似的解析计算 惠 萍等 2 人 19(1995)820
- (2 + 1) 维 $SU(2)$ 格点规范场胶球质量的解析计算 惠 萍等 3 人 20(1996)55
- 2 + 1 维 $SU(2)0^{++}$ 胶球波函数的四级近似 胡 连等 3 人 21(1997)995
- 陈 泉** $^{56,57}\text{Fe}, ^{59}\text{Co}(\alpha, d)$ 核反应及拉长态性质的实验研究 袁 坚等 5 人 20(1996)32
- 陈韶林** $84.0\text{MeV}^{16}\text{O}$ 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
- 陈少敏** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+\tau^- \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073

- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 北京 τ -c工厂(BTCF)快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 陈申见 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 过程 $J/\psi \rightarrow \gamma X$, $X \rightarrow P_1 P_2$ 中 X 自旋的矩分析法 陈申见等 3 人 17(1993)961
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- 陈沈南 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 陈师平 对电子中微子质量为虚数的质疑 庆承瑞等 6 人 19(1995)27
- 陈世浩 强子作为非拓扑孤粒子的 $SU(5)$ 大统一模型(I) 18(1994)317
- 强子作为非拓扑孤粒子的 $SU(5)$ 大统一模型(II) 18(1994)409
- 陈天仑 $SU(2) \times SU(2)$ 格点手征模型的进一步研究 黄良鑫等 3 人 19(1995)245
- 陈廷杨 最可几法在带电粒子径迹重建中的应用 18(1994)302
- 陈侠先 K^+ 核散射与非线性密度相关修正 闵德芬等 6 人 17(1993)462
- 陈相君 有限温度下无质量 ϕ^3 理论中角度红外发散的正规化 陈相君等 2 人 19(1995)907
- 有限温度下无质量场真空中红外发散的正规化 陈相君等 2 人 21(1997)425
- QGP中胶子的经典输运方程 21(1997)597
- 夸克的半经典输运方程 陈相君等 3 人 21(1997)905
- 陈向阳 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- 陈小林 三玻色子核的核谱研究 张庆营等 4 人 18(1994)353
- $1/N$ 展开技术的一些应用 张庆营等 4 人 20(1996)252
- 陈新峰 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
- 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
- ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
- ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
- ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
- 陈新镛 在 $Z \rightarrow b\bar{b}$ 衰变中 Gluino 和 Squark 的质量效应 胡炳全等 4 人 17(1993)44
- 陈星冀 从正常形变看超形变带角动量的确定 陈星冀等 2 人 17(1993)1102
- 超形变带的两带混合模型 邢正等 3 人 18(1994)62
- $A \sim 150$ 区超形变带唯象分析 陈星冀等 3 人 18(1994)256
- 粒子-转子模型分析超形变转动带 陈星冀等 2 人 18(1994)448
- 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
- 奇 A 核超形变全同带分析 邢正等 2 人 19(1995)354
- $^{157,159}\text{Tm}$ 基态附近性质的研究 邢正等 3 人 20(1996)85

- 奇 $A^{117-125}\text{Cs}$ 核 $\pi h_{11/2}$ 带的研究 邢 正等 5 人 20(1996)639
- 转动对超形变带能谱和 $M1$ 跃迁的影响 邢 正等 3 人 20(1996)750
- $^{149}\text{Gd}(\text{b}1)$ 和 $^{153}\text{Dy}(\text{b}1)$ 超形变带能量的 $\Delta I = 2$ Staggering 邢 正等 3 人 21(1997)1041
- 陈学兵 Moyer 模式在高能重离子加速器辐射防护屏蔽设计中的应用 朱连芳等 4 人 20(1996)858
- 陈学俊 反质子与电子偶素碰撞而形成反氢原子的探讨 程子韬等 4 人 17(1993)448
- 陈雅清 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\pi, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 陈 岩 在 $p\bar{p}$ 反应中的夸克对产生率、奇异抑制因子和重子介子比 陈鄂生等 2 人 19(1995)612
- 陈银宝 束流传输管道孔径变化引起的束团场能差 陈银宝等 3 人 20(1996)571
- 直线加速器中双向高斯密度分布电荷束团发射度增长的比率关系 陈银宝等 3 人 21(1997)657
- 陈永清 量子超代数 $sl_q(2, 1)$ 的 q 变形玻色-费米表示 17(1993)631
- 陈永寿 奇 A Tm 同位素链及 $[411\ 1/2]$ 带退耦参数性质的研究 董宝国等 3 人 21(1997)838
- 陈永中 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
- 陈 宇 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈 宇等 8 人 17(1993)673
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\pi, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

- 陈元柏 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 陈展图 ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 陈志谦 高 $T_c\text{GdBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ 中 Fe 的结合强度与氧配位 17(1993)971
- 陈智超 ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- 成正东 $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
 $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞横快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
 J/ψ 强衰变产生的 $\theta(1720)$ 宽共振峰的研究 郁宏等 5 人 17(1993)601
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 成之绪 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 程宝森 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
北京 τ -c 工厂 (BTCLF) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 程凌翔 小样本时皮尔森 χ^2 量概率分布的讨论 吴枚等 4 人 18(1994)879
- 程松 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052

- 程香爱 $R(5)$ 群 Casimir 算子对核子 JT 耦合态的进一步分类 陈健华等 4 人 19(1995)424
- 程晓伍 利用加速器质谱计测量 ^{10}Be 形成截面 刘联璠等 6 人 19(1995)786
- 程玉芬 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 程子韬 反质子与电子偶素碰撞而形成反氢原子的探讨 程子韬等 4 人 17(1993)448
- N 、 Δ 重子谱计算中高组态混合效应的影响 程子韬等 3 人 20(1996)658
- 双超核 $^5_{\Lambda\Lambda}\text{H}$, $^5_{\Lambda\Lambda}\text{He}$, $^4_{\Lambda\Lambda}\text{H}$, $^4_{\Lambda\Lambda}\text{He}$ 的研究 程子韬等 2 人 20(1996)736
- 程 岚 关于 $M-3Y$ 力等效 G 矩阵元在重核区的有效性 程 岚等 3 人 20(1996)246
- 储自力 重离子碰撞中产生的 K 介子末态作用 储自力等 4 人 19(1995)365
- 重离子碰撞中 K 介子和 π 介子产生的统一动力学模拟 储自力等 5 人 20(1996)438
- 200A GeV pp, pS 和 SS 碰撞中单奇异粒子产生数据的分析 萨本豪等 3 人 21(1997)720
- 崔聪悟 北京同步辐射装置软 X 光束通量谱的绝对测量与计算 崔明启等 6 人 20(1996)847
- 崔化传 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- 崔建营 有限温度阿贝尔格点规范理论相变的解析研究 刘文生等 4 人 18(1994)996
- 崔明启 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13
- 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
- 北京同步辐射装置软 X 光束通量谱的绝对测量与计算 崔明启等 6 人 20(1996)847
- 崔象宗 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

D

- 戴本忠 太阳耀斑与太阳高能粒子 张 力等 3 人 20(1996)877
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 戴长江 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈 宇等 8 人 17(1993)673

- 戴光曦** $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
 46.7MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
 三分裂中的级联裂变模式 吴和宇等 2 人 18(1994)730
 20MeV 到 180MeV / u $^{16}\text{O} + ^{197}\text{Au}$ 系统的 BUU 计算: 线动量与角动量转移依赖碰撞参数与能量研究 阎德宏等 5 人 18(1994)1035
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 对称多重裂变的形变位势垒及其对核温度的依赖性 19(1995)447
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
 中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
 热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
 非全熔合反应裂变角分布 刘国兴等 4 人 21(1997)777
- 戴贵亮** 用神经网络分辨原初宇宙线成份 梁化楼等 5 人 21(1997)205
- 戴宏跃** 银河宇宙线的统计模型 徐春娟等 2 人 21(1997)486
- 戴立盛** 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 北京自由电子激光 Wiggler 中电子轨迹偏离的改进 黄 敏等 5 人 18(1994)1137
- 戴连荣** 夸克-夸克等效相互作用与手征对称性 余友文等 4 人 19(1995)431
 壳模型下探讨 ^{6-11}Li 核的某些异常性质 戴连荣等 2 人 19(1995)646
 轻核结构 (I) Li 同位素核的结构性质 顾金南等 3 人 20(1996)185
 $SU(3)$ 模型中夸克与手征场的相互作用 张宗桦等 3 人 20(1996)363
 q 形变壳模型中奇 A 核的磁矩 潘 峰等 2 人 20(1996)538
- 戴启润** Fermi-Dirac 关联与 $Q^{-\nu}K_{\nu}(Q)$ 分布 戴启润等 4 人 20(1996)1014
- 戴运生** 快中子在 Li 核上的弹性散射微分截面 张 坤等 5 人 19(1995)879
- 戴征宇** ^{128}Ce 16^+ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
- 党秉荣** $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
 46.7MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
 重离子 Bragg 峰的研究及其应用 李 强等 4 人 21(1997)571
- 邓 斌** 氟化铍团簇基纳米相薄膜的慢正电子研究 巨 新等 5 人 21(1997)844
- 邓炳坤** 微条气体室的研制 郁忠强等 5 人 20(1996)678
 微间隙室的研制 郁忠强等 5 人 21(1997)494
- 邓景康** 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
 BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
- 邓胜华** 在有限温度下手征孤子的消失与手征相变 邓胜华等 2 人 17(1993)140
 F-L 模型的状态方程与退禁闭相变图象 邓胜华等 2 人 18(1994)424
 有限温度下非拓扑孤子模型的双圈有效势 邓胜华等 3 人 19(1995)713
- 邓树森** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 邓卫真** 相互作用玻色子模型的非厄米 Dyson 玻色子展开途径 邓卫真等 3 人 17(1993)907

- 维数正规化和 NJL 模型 π 介子性质 张建玮等 4 人 18(1994)821
- 邓亦卫 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 邓 越 高能碰撞中动力学起伏的横动量守恒约束 张 阳等 3 人 21(1997)130
- 核-核碰撞间歇现象的混合效应 胡 源等 3 人 21(1997)604
- 狄尧民 IBM-II 连续变量表示动态运动方程的解 狄尧民等 4 人 17(1993)559
- 三体 heritage 混合相互作用和核转动惯量的变化 19(1995)554
- 丁慧良 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 丁惠明 偶偶 γ 不稳定核 Stretching 效应的微观机制 吴连勋等 2 人 19(1995)1047
- 一个微观两参数核模型和它对超铀区核 Yrast 线的应用 吴连勋等 3 人 20(1996)182
- 丁林恺 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 强子相互作用中次级粒子纵向动量对多重数的依赖 经才骝等 2 人 18(1994)865
- 宇宙线超高能相互作用的 QCD 部分子模型产生器 曹 臻等 2 人 18(1994)961
- 超高能软强子作用的 Chou-Yang 模型 曹 臻等 2 人 18(1994)990
- p -A 作用的非弹性度及对靶核质量的依赖 荆贵茹等 4 人 18(1994)1057
- 高能强子与原子核碰撞的受伤核子数分布和非弹性截面的计算 任江龙等 2 人 20(1996)119
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 丁维闻 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 丁祥茂 中心扩张的 sl_2 双重 Yangian 的 Miura 变换 丁祥茂等 3 人 21(1997)697
- 丁亦兵 Δr 的实验测量与唯象分析 肖振军等 3 人 17(1993)516
- 在 LEP II 及 NLC 能量下 $e^+e^- \rightarrow b\bar{b}Z^0$ 和 $t\bar{t}Z^0$ 过程中 Higgs 粒子的观测效应 丁亦兵等 5 人 20(1996)982
- 丁有贵 $^{171}\text{Lu } 1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- 董保国 奇 A Tm 同位素链及 $[411 \ 1/2]$ 带退耦参数性质的研究 董宝国等 3 人 21(1997)838
- 董宝中 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97

- 同步辐射小角散射实验站 董宝中等 4 人 19(1995)284
- 董成富 对 ^{69}Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
- 董晓黎 在低能 e^+e^- 湮没中寻找低质量中性粒子 何景棠等 4 人 18(1994)404
- 硅光电二极管作为 CsI(Tl) 晶体读出元件的实验研究 何景棠等 5 人 20(1996)890
- CsI(Tl) 晶体的辐照损伤研究 何景棠等 5 人 21(1997)21
- 硅酸铋 (BSO) 晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 董雪生 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 董宇兵 重夸克偶素中的色屏蔽效应 董宇兵等 3 人 17(1993)472
- 不同特点的禁闭位和高组态混合效应对 N, Δ 能谱的影响 董宇兵等 2 人 17(1993)651
- $b\bar{b}$ 体系中的色屏蔽效应 董宇兵等 4 人 18(1994)547
- N, Δ 重子谱中负能级分量的作用 19(1995)178
- 重夸克等效理论和重味强子体系质量谱的研究 19(1995)748
- 质子自旋性质的研究 19(1995)936
- 粲夸克偶素和 b 夸克偶素的色屏蔽和分解 刘 波等 2 人 20(1996)153
- 极化海夸克对激发对核子的自旋相关性质的影响 20(1996)175
- 基态介子辐射衰变中的屏蔽效应 20(1996)265
- N, Δ 重子谱计算中高组态混合效应的影响 程子韬等 3 人 20(1996)658
- 相对论效应对有限温下重夸克偶素的性质的影响 20(1996)819
- 自旋相关相对论修正对重夸克偶素性质的研究 21(1997)860
- 相对论谐振子模型对重 γ 共振态螺旋度振幅的计算 21(1997)1035
- 董玉琨 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
- 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线“膝”区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
- 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
- 杜淮江 不锈钢在 14.6MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
- 杜一飞 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
- 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
- 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
- ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
- 杜志珍 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

- 段春贵** 核子的组分夸克模型与 $O + U \rightarrow \mu\bar{\mu} + X$ 过程 莫文玲等 4 人 18(1994)282
推广 x 重新标度模型与核内核子的胶子分布函数 段春贵等 4 人 21(1997)433
改进的 Q^2 -重标度模型与部分子分布函数的核效应 姚晓霞等 5 人 21(1997)548
价夸克分布与海夸克分布的核效应 侯召宇等 4 人 21(1997)639
- 段利敏** $25\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}(25\text{MeV}/u)$ 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
 $25\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
- 段宜武** ^{11}Li 的中子晕结构 段宜武等 2 人 18(1994)736
 ^{11}Li 的三体模型 19(1995)59

F

- 樊明武** CYCLAE 型回旋加速器负离子剥离引出的光学行为研究 肖美琴等 3 人 20(1996)1110
- 樊铁栓** 中子诱发 $^{233,235,238}\text{U}$ 裂变机制的多通道理论研究 樊铁栓等 3 人 20(1996)422
- 范恩杰** $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 $46.7\text{MeV}/u$ $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
 CsI(Tl)^+ 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 轰击 ^{197}Au , ^{115}In , ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
- 范 析** Z_n 格点模型的量子仿射变形代数 石康杰等 4 人 19(1995)229
用玻色化顶点算子实现与 Z_n 对称的 Belavin R 矩阵相关的 Z - F 代数 石康杰等 4 人 21(1997)70
- 范世骧** 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 范晓龄** 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057

- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 北京 τ -c工厂(BTCF)快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 范扬眉 不锈钢在 14.6MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
- 方澄 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 方建 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 方克明 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
- 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 方守贤 在北京正负电子对撞机上采用小包络函数永久磁铁方案的可行性 李光晓等 2 人 19(1995)952
- 方伟珍 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 方锡岩 格点 Chern-Simons 理论的量子化 郭硕鸿等 2 人 18(1994)706
- 2 + 1 维 $SU(3)$ 格点纯规范场的真空态计算 陈启洲等 3 人 19(1995)398
- 费一汀 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 冯大春 中能质子相对论光学势分析 冯大春等 3 人 17(1993)372
- 冯恩普 46.7MeV / u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
- 46.7MeV / u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
- 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au 、 ^{115}In 、 ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
- TR4 终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
- 冯 军 中能区 $^{86}\text{Kr} + ^{197}\text{Au}$ 反应中的能量耗散、 π 介子阈下产生和流角 马余刚等 4 人 17(1993)186
- 一个在 SPEG 磁谱仪上鉴别中能重离子反应中中重产物的分析方法 冯 军等 6 人 17(1993)769
- 中子分布弥散度对反应总截面的影响 冯 军等 3 人 18(1994)97
- 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶 巍等 12 人 21(1997)1

- 用动力学模型计算 $10.6\text{MeV} / \text{u}$ $^{84}\text{Kr}(^{27}\text{Al}, \text{准裂变})$ 反应的裂变时间 叶 巍等 6 人
21(1997)348
- 冯 芒 三玻色子核的核谱研究 张庆营等 4 人 18(1994)353
 $1/N$ 展开技术的一些应用 张庆营等 4 人 20(1996)252
- 冯仁发 核裂变扩散模型 Kramers 定态解的理论分析 冯仁发等 3 人 18(1994)361
- 冯 胜 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 冯振勇 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 冯 忠 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 冯中汉 AGS 能量下 $\pi^-\pi^-$ 的 Bose-Einstein 关联 冯中汉等 3 人 20(1996)142
- 冯笙琴 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能强子-核作用中快度分布与横能的关联 冯笙琴等 2 人 19(1995)916
高能核-核作用中不同带电强子快度分布 冯笙琴等 2 人 20(1996)919
- 符 建 与不变量有关的么正变换方法和三次量子化宇宙波函数的演化 高孝纯等 3 人 20(1996)226
- 伏云昌 反质子与电子偶素碰撞而形成反氢原子的探讨 程子韬等 4 人 17(1993)448
- 傅德基 IBM-II 连续变量表示动态运动方程的解 狄尧民等 4 人 17(1993)559
动力学对称性研究的拓扑途径——相互作用玻色子模型中的应用示例 傅德基等 4 人
17(1993)1032
关于形变壳组态方法在过渡核及中重核的应用 朱志远等 2 人 17(1993)1120
- 傅恩生 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 傅洪忱 量子(超)代数在 $q^p=1$ 时的循环表示 傅洪忱等 2 人 17(1993)700
- 傅世年 束流传输管道孔径变化引起的束团场能差 陈银宝等 3 人 20(1996)571
直线加速器中双向高斯密度分布电荷束团发射度增长的比率关系 陈银宝等 3 人 21(1997)657
- 付正善 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97

G

- 甘再国 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 高成群 重离子深光学势和宇称相关作用 高成群等 3 人 17(1993)665
相同质量 $4N$ 核间的半微观光学势 周全华等 3 人 18(1994)460
质量相近 $4N$ 核间宇称相关势的折叠模型 周全华等 3 人 18(1994)1051
 $^{20}\text{Ne} + ^{12}\text{C}$ 系统与深光学势下的双 α 转移效应 高成群等 3 人 20(1996)159
 $^{16}\text{O} + ^{12}\text{C}$ 熔合截面粗共振现象的研究 21(1997)530
 $^{16}\text{O} + ^{24}\text{Mg}$ 熔合激发函数和深光学势 21(1997)751
- 高翠山 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577

- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ $\rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 高海啸** 规范理论中的量子守恒荷 高海啸等 2 人 21(1997)506
- 高立新** 无粲 B 重子与衰变的 $SU(3)_c$ 预言 侯云智等 2 人 17(1993)1091
- 高良俊** 核激子态的瞬时概率分布和非平衡熵 潘忠诚等 4 人 17(1993)444
- 不同激发能的 ^{208}Pb 核的非平衡态的概率分布与熵 潘忠诚等 3 人 19(1995)757
- 高美丽** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ $\rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 高 琴** 相对论微观光学势中相互作用力程的效应 朱 萍等 3 人 17(1993)549
- 高守恩** 有限温度下赝标耦合中的 η 介子 高守恩等 4 人 18(1994)148
- 高树琦** J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89

- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 高文绣 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- 高孝纯 CP 模型的拓扑项的可移性与 θ 真空 高孝纯等 2 人 18(1994)137
- 2 + 1 维 CP 模型拓扑项可移性研究 高孝纯等 2 人 19(1995)413
- 与不变量有关的么正变换方法和三次量子化宇宙波函数的演化 高孝纯等 3 人 20(1996)226
- 高原宁 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 高 嵩 QGP 中反应过程的内线统计效应 高 嵩等 2 人 18(1994)229
- 有限密度下的核子有效质量和 EMC 效应的一种可能解释 马凤才等 3 人 20(1996)651
- QGP 中的热胶子质量和 $J/\psi, \psi'$ 的分解 高 嵩等 3 人 21(1997)322
- ρ - ω 混合和介质中的中子-质子质量差 刘 波等 4 人 21(1997)953
- 高 隼 与不变量有关的么正变换方法和三次量子化宇宙波函数的演化 高孝纯等 3 人 20(1996)226
- 葛凌霄 中能区 $^{86}\text{Kr} + ^{197}\text{Au}$ 反应中的能量耗散、 π 介子阈下产生和流角 马余刚等 4 人 17(1993)186
- 费米能区重离子碰撞动力学 (III) 碎裂与极限激发能 左 维等 3 人 17(1993)644
- 25MeV / A $^{20}\text{Ne} + ^{20}\text{Ne}$ 周边碰撞 朱全伶等 2 人 17(1993)658
- 中能重离子碰撞中的阵发混沌 葛凌霄等 3 人 18(1994)428
- 重离子碰撞中能量储藏同入射道动力学的关系 曾祥华等 3 人 18(1994)842
- 重离子碰撞中的同位旋效应 朱全伶等 3 人 18(1994)853
- 在非相对论能量下介质中的核子-核子碰撞截面 葛凌霄等 2 人 19(1995)921
- 中能重离子碰撞中的涨落和中间质量碎片发射的机制 张晓东等 2 人 19(1995)945
- QMD 模型对 ^{11}Li 引起反应的研究 张晓东等 2 人 20(1996)270
- 多重碎裂和相互作用势的涨落 李君清等 5 人 20(1996)332
- 中能区重离子碰撞中径向膨胀能量研究 曾祥华等 2 人 20(1996)345
- 重离子反应中核子前平衡发射的同位旋效应 陈列文等 3 人 20(1996)1091
- 重离子碰撞中的热化、膨胀和径向流 曾祥华等 2 人 21(1997)157
- 原子核多重碎裂的静态理论 I 相变和多重碎裂 张丰收等 2 人 21(1997)340
- 原子核多重碎裂的静态理论 II 间歇类型和临界行为 张丰收等 2 人 21(1997)445
- 中能重离子反应中“neck”的形成和碎裂 陈列文等 3 人 21(1997)1018
- 葛墨林 量子(超)代数在 $q^p = 1$ 时的循环表示 傅洪忱等 2 人 17(1993)700
- 葛元秀 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
- 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(EC + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)285
- 合成和研究滴线区新核素 β 延发质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 耿荣礼 激光驱动光阴极高亮度电子束源以及新型光阴极的研究 耿荣礼等 3 人 21(1997)67
- 耿天明 四级交换图对相对论微观光学势的贡献 韩银录等 4 人 17(1993)751
- 耿晓松 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756

- 宫蒂 独立元格试探作用量对 3 维 $SU(2)$ 格点规范理论相结构的变分研究 刘金明等 2 人 17(1993)128
- 宫竹芳 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
- 勾成 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 勾亮 一种包括三代费米子的统一模型 陈凤至等 2 人 19(1995)513
- 苟全卜 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
- 古中道 对 ^{69}Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
- 顾建辉 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
- 北京谱仪上宇宙线 μ 样本的选择 顾建辉等 2 人 20(1996)26
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $1/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 顾建中 从始态到准稳态过程的数字描述 顾建中等 2 人 17(1993)835
- 重原子核中单粒子的最邻近能级间距和能级曲率分布 顾建中等 4 人 21(1997)535
- 顾金南 有效玻色子数及其应用 赵玉民等 2 人 18(1994)68
- Pb 核性质和残余相互作用 19(1995)64
- IBM-2 有效玻色子数和它在系统学中的应用 赵玉民等 2 人 19(1995)548
- 壳模型下探讨 ^{6-11}Li 核的某些异常性质 戴连荣等 2 人 19(1995)646
- 轻核结构 (I) Li 同位素核的结构性质 顾金南等 3 人 20(1996)185
- 轻丰中子核的壳模型计算 张长华等 2 人 20(1996)240
- $A=147-153$ 核的 Gamow-Teller 跃迁 张长华等 2 人 20(1996)745
- ^{11}Be 的结构 张长华等 2 人 21(1997)260
- 铅区核的结构 (I) $^{207-210}\text{Tl}, ^{207,208}\text{Hg}$ 的能谱和波函数 张长华等 2 人 21(1997)734
- 铅区核的结构 (II) $^{208}\text{Tl}, ^{208}\text{Pb}$ 和 $^{206-208}\text{Hg}$ 的一级禁戒 β 衰变 张长华等 2 人 21(1997)812
- 顾牡 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
- 顾树棣 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193

- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 顾维新** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 硅微条探测器的辐射损伤试验 顾维新等 2 人 21(1997)292
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 顾以藩** 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈宇等 8 人 17(1993)673
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 管习文** 关于双参数量子代数 $SU_{qs}(2)$ 和双参数形变谐振子的若干结果 周焕强等 3 人 19(1995)420
 具有 $U_{qp}(U3) \supset U_{qp}(U2) \supset U_{qp}(SO_2)$ 对称的双参数形变二维相互作用玻色子模型 周焕强等 3

- 人 20(1996)38
- 管应重 J/ ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 郭斌 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
- 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(\text{EC} + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)289
- 郭光辉 多丝室工作于自猝灭流光模式下定位特性的研究 陈宏芳等 5 人 17(1993)582
- ^{208}Hg 鉴别 张立等 12 人 18(1994)296
- $4\pi\Delta E_{\beta}$ 探测器的建立及其在丰中子核素研究中的应用 王积成等 5 人 19(1995)653
- $28\text{MeV}/u$ ^{18}O 与全阻止厚天然铅靶反应中丰中子汞同位素的截面测量 王积成等 5 人 19(1995)686
- 郭汉英 量子偶和量子偶对-量子代数 and 量子群的关系 吴可等 3 人 17(1993)262
- 量子张量偶及量子群的实现 吴可等 2 人 17(1993)796
- 编织假设与杨-Baxter 方程的解 张军等 3 人 21(1997)714
- 郭红菲 J/ ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 郭华 多体关联格林函数动力学 IV. 相对论推广 左维等 3 人 18(1994)616
- 正则形式的 $SU(N)$ 规范理论的约束关联动力学 (I) 关联 Green 函数的运动方程 王顺金等 2 人 19(1995)270
- 正则形式的 $SU(N)$ 规范理论的约束关联动力学 (II) 规范理论的约束条件 王顺金等 2 人 19(1995)332
- 正则形式的 $SU(N)$ 规范理论的约束关联动力学 (III) 等时关联 Green 函数的运动方程与二体关联近似 郭华等 2 人 19(1995)455
- 正则形式的 QED 约束关联动力学 (I) 关联格林函数的运动方程 郭华等 2 人 20(1996)48
- 正则形式的 QED 约束关联动力学 (II) 等时关联格林函数的运动方程与二体关联近似 郭华等 2 人 20(1996)131
- 郭俊盛 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
- ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
- 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
- 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
- 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 郭康柱 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 郭立波 Technicolor 理论中的赝标格尔斯通粒子对 $t \rightarrow W^+ b$ 过程所产生的虚效应 王学雷等 5 人 18(1994)1086
- 郭立平 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 郭硕鸿 $2+1$ 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的红外形式 陈启洲等 4 人 18(1994)37
- $2+1$ 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的研究 陈启洲等 4 人 18(1994)417
- 格点 Chern-Simons 理论的量子化 郭硕鸿等 2 人 18(1994)706
- $2+1$ 维 $SU(3)$ 格点纯规范场的真空态计算 陈启洲等 3 人 19(1995)398
- 郭天瑞 ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
- 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
- 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201

- ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张立等 8 人 21(1997)891
新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 郭晓红 ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 郭新恒 BSW 方案中的模型相关性 罗传望等 5 人 18(1994)601
- 郭应焱 掺硫和在不同温度下 InP 的正电子湮没研究 黄懋容等 6 人 20(1996)1097
- 郭应祥 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的($\text{EC} + \beta^+$)衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)285
 ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 郭愚益 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 郭昭乔 硅微条探测器的研制 毛裕芳等 3 人 17(1993)784
- 郭正元 郑州 EAS 观测阵列的设计和初期运行 孙洛瑞等 4 人 17(1993)595
- 郭忠言 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 $46.7\text{MeV}/u$ $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 $46.7\text{MeV}/u + ^{12}\text{C}$ 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
 $\text{CsI(Tl)} +$ 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481
一个在 SPEG 磁谱仪上鉴别中能重离子反应中中重产物的分析方法 冯军等 6 人 17(1993)769
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王琦等 12 人 18(1994)398
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 轰击 ^{197}Au 、 ^{115}In 、 ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
TR4 终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
大动态范围多维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
 $\text{NE102A} + \text{CsI(Tl)} + \text{PMT}$ 中能重离子探测器望远镜 祁中等 11 人 21(1997)481
用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁中等 11 人 21(1997)577
- 国智元 北京正负电子对撞机束团拉伸效应研究 国智元等 3 人 20(1996)1034
- 过雅南 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97

- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 J/ψ → $\gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

H

- 哈益明 IBM-II 连续变量表示动态运动方程的解 狄尧民等 4 人 17(1993)559
韩斌 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
韩洪银 ^{252}Cf 冷裂变瞬发 γ 射线 韩洪银等 4 人 19(1995)8
韩家祥 气体雪崩过程中光电信号的时间关联 许咨宗等 4 人 19(1995)775
气体雪崩放电的单光子测量时间谱 韩家祥等 5 人 20(1996)885
韩其智 Xe 偶-偶同位素低激发态性质的 IBM2 描述 张大立等 3 人 18(1994)1130
韩荣典 金属玻璃 $\text{Pd}_{79.5}\text{Ni}_4\text{Si}_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
Al/GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
不锈钢在 14.6MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
氟化锂团簇基纳米相薄膜的慢正电子研究 巨新等 5 人 21(1997)844
韩世温 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
闪烁体瓦片/光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 J/ψ → $\gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385

- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 韩银录 温度相关的核子相对论微观光学势 韩银录等 3 人 17(1993)568
- 四级交换图对相对论微观光学势的贡献 韩银录等 4 人 17(1993)751
- 韩 纁 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S)的τ轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由ψ(2S)→π⁺π⁻J/ψ道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- ψ(2S)→ρπ及ψ(2S)→K $\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于ι/η(1440)的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- ψ(2S)强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ→γπ⁰、γη、γη'→3γ衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 韩 勇 PDHF 方法应用于 f_p 奇 A 核 ^{47}Ti 、 ^{47}V 、 ^{47}Cr 、 ^{49}Cr 的能谱研究 韩 勇等 2 人 21(1997)541
- BSRF白光动态形貌实验系统 王功利等 5 人 21(1997)763
- 郝三如 静轴对称 SDYM 场的一种新的对称变换 17(1993)412
- 静轴对称自对偶 Yang-Mills 场的隐对称及其代数结构 17(1993)538
- q 变形带电 Fermion 相干态和 q' 变形的 SU(3) 电荷、超荷 Fermion 相干态 郝三如等 3 人 18(1994)919
- 郝 伟 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 何长孝 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
- 何国柱 垒下融合反应的一种α粒子转移的解释 申 虹等 2 人 17(1993)161
- 何会海 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
- 何会林 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
- 何建军 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 何景棠 在低能 e^+e^- 湮灭中寻找低质量中性粒子 何景棠等 4 人 18(1994)404
- 硅光电二极管作为 CsI(Tl) 晶体读出元件的实验研究 何景棠等 5 人 20(1996)890
- 关于ι/η(1440)的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- CsI(Tl) 晶体的辐照损伤研究 何景棠等 5 人 21(1997)21
- 北京谱仪上 J/ψ→γπ⁰、γη、γη'→3γ衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 何 炬 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S)的τ轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577

- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 J/ψ $\rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 何可人 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- 何永枢 掺硫和在不同温度下 InP 的正电子湮没研究 黄懋容等 6 人 20(1996)1097
- 何元金 HgCdTe 中特征正电子湮没寿命值的确定 何元金等 3 人 18(1994)752
- 何原 格点定模 SU(2)-Higgs 模型的解析计算 郑希特等 4 人 19(1995)137
- 何淦明 高能 α 粒子与 ^4He 的弹性散射 何淦明等 2 人 17(1993)925
- 何瑞 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 J/ψ $\rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 何祚庠 BES 新测 τ 轻子质量的物理含意 吴济民等 2 人 17(1993)511
 对电子中微子质量为虚数的质疑 庆承瑞等 6 人 19(1995)27
- 何祚民 核子的组分夸克模型与 $O + U \rightarrow \mu\bar{\mu} + X$ 过程 莫文玲等 4 人 18(1994)282

- 高能 $p + p(\bar{p})$ 碰撞中 J/ψ 和 Υ 的硬衍射产生 彭宏安等 3 人 18(1994)1078
- 高能 $p + p(\bar{p})$ 碰撞中双重 Pomeron 交换和 J/ψ , Υ 产生过程 彭宏安等 3 人 19(1995)34
- 关于 $\mathbb{P}$ 的结构模型(部分子分布)的检验 何祯民等 4 人 19(1995)310
- 推广 x 重新标度模型与核内核子的胶子分布函数 段春贵等 4 人 21(1997)433
- 改进的 Q^2 -重标度模型与部分子分布函数的核效应 姚晓霞等 5 人 21(1997)548
- 价夸克分布与海夸克分布的核效应 侯召宇等 4 人 21(1997)639
- 贺金玉 双参数形变谐振子湮没算符高次幂的本征态 王继锁等 3 人 20(1996)703
- 贺劲松 双参数形变谐振子湮没算符二次幂的本征态 周焕强等 3 人 19(1995)251
- 关于双参数量子代数 $SU_{qs}(2)$ 和双参数形变谐振子的若干结果 周焕强等 3 人 19(1995)420
- 具有 $U_q(U_3) \supset U_q(U_2) \supset U_q(SO_2)$ 对称的双参数形变二维相互作用玻色子模型 周焕强等 3 人 20(1996)38
- 贺泽君 一个膨胀的热核物质的双轻子谱 贺泽君等 3 人 17(1993)731
- 强子的内部激发和 QCD 真空在核物质的热力学行为上的效应 贺泽君等 4 人 17(1993)1126
- 膨胀的热的富重子夸克——胶子物质的双轻子产生的抑制 贺泽君等 3 人 19(1995)165
- 中心快度区的双轻子不变质量分布 贺泽君等 3 人 19(1995)1036
- 夸克-胶子物质的特征双轻子分布 21(1997)269
- 贺智勇 46.7MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
- 57MeV / u $^{64}\text{Zn} + ^{27}\text{Al}$ 反应中集体流的研究 贺智勇等 24 人 18(1994)800
- 20MeV 到 180MeV / u $^{16}\text{O} + ^{197}\text{Au}$ 系统的 BUU 计算:线动量与角动量转移依赖碰撞参数与能量研究 阎德宏等 5 人 18(1994)1035
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
- $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV / u)产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
- 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
- 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
- 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
- 中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
- 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
- 热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$ 、 ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 洪宝森 多丝室工作于自猝灭流光模式下定位特性的研究 陈宏芳等 5 人 17(1993)582
- 洪 蓉 北京正负电子对撞机(BEPC)4W1A 光束线光束中心监测与 X 光激发荧光信噪比的观测
- 洪 蓉等 5 人 17(1993)403
- 同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
- 侯伯宇 WZNW 模型的共形约化,扩展的手征代数及相应的 Toda 类可积模型(I)一般构架 侯伯宇等 2 人 17(1993)28
- WZNW 模型的共形约化,扩展的手征代数及相应的 Toda 类可积模型(II)一个例子 侯伯宇等 2 人 17(1993)241
- WZNW 模型的不同约化相应的 W 代数的联系 侯伯宇等 2 人 17(1993)329
- (广义)BFOFW 模型的 Hamilton 程式及其量子化 侯伯宇等 2 人 17(1993)524
- 活动标架系下 $O(n)$ 非线性 σ 模型 Laxpair 矩阵的 Poisson-Lie 结构 王延申等 2 人 18(1994)892

- 三维精确可解统计模型——Baxter-Bazhanov模型的可积性条件 胡占宁等2人 19(1995)123
- Z_n 格点模型的量子仿射变形代数 石康杰等4人 19(1995)229
- $SU(2)$ Thirring 模型边界算子的 Boson 表达式 王延申等5人 20(1996)216
- Z_n Belavin 模型的反射矩阵 陈敏等3人 20(1996)794
- 中心扩张的 sl_2 双重 Yangian 的 Miura 变换 丁祥茂等3人 21(1997)697
- 用玻色化顶点算子实现与 Z_n 对称的 Belavin R 矩阵相关的 Z - F 代数 石康杰等4人 21(1997)706
- 侯伯元 完全可积 $O(3)$ - σ 模型与 r, s 矩阵 李银万等3人 18(1994)518
- 侯德富 高温下弱电相变的自治研究 侯德富等2人 18(1994)928
- 热场动力学中的切割图方法及热格林函数的虚部 侯德富等2人 19(1995)891
- 任意规范下有限温度二圈 QED 热力学势及其交叉发散 侯德富等2人 19(1995)998
- 夸克胶子等离子体中的次带头阶得拜屏蔽质量 侯德富等2人 20(1996)533
- 侯明东 Ar 离子辐照非晶态合金表面发泡和针孔形成研究 刘昌龙等4人 20(1996)763
- Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等10人 21(1997)1052
- 侯云珍 闪烁光纤光传输特性的研究 江晓莲等7人 21(1997)787
- 侯云智 无禁 B 重与衰变的 $SU(3)_c$ 预言 侯云智等2人 17(1993)1091
- $SU(3)$ 下的美介子半轻子衰变 李作宏等2人 18(1994)715
- B 重子半轻子衰变的对称性 18(1994)836
- 侯召宇 价夸克分布与海夸克分布的核效应 侯召宇等4人 21(1997)639
- 胡炳全 在 $Z \rightarrow b\bar{b}$ 衰变中 Gluino 和 Squark 的质量效应 胡炳全等4人 17(1993)44
- 胡贵云 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等151人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等199人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等149人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等201人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等137人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等151人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等187人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等193人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等195人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等150人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等198人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等198人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等147人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等205人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等161人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等161人 21(1997)961
- 胡洪波 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等199人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等149人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等201人 19(1995)385
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等151人 19(1995)673
- 胡济民 用变分法解 Fokker-Planck 方程计算核裂变几率 钟云霄等2人 18(1994)340
- 多维 Kramers 公式的研究 钟云霄等2人 18(1994)949
- 原子核振动与转动模型(I) 推转玻尔-莫特逊哈密顿量和偶偶核正常转动谱分析 胡济民等3人

- 20(1996)76
 原子核的振动与转动模型(II)奇 A 核正常转动谱分析 胡济民等 3 人 20(1996)259
 应用原子核的宏观-微观模型研究远离稳定线核的性质 郑春开等 3 人 20(1996)317
 推广的 Thomas-Fermi 方法中适用的新式核密度 安宇等 2 人 20(1996)324
 中子诱发 $^{233, 235, 238}\text{U}$ 裂变机制的多通道理论研究 樊铁栓等 3 人 20(1996)422
 原子核的振动与转动模型 (III) $A \sim 190$ 区超形变带研究 许甫荣等 3 人 20(1996)554
 重离子熔合反应的相互作用势 胡济民等 2 人 20(1996)932
 轻核结构的微观计算 白新华等 2 人 21(1997)235
 轻核中中子间的对相互作用和中子晕 白新华等 2 人 21(1997)932
- 胡经国 $SU(2)$ 纯格点规范场热力学非对称点阵 Monte-Carlo 模拟 21(1997)801
- 胡敬亮 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 北京 τ -c 工厂 (BTCF) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 胡力东 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 胡连 $2+1$ 维 $SU(2)0^{++}$ 胶球波函数的四级近似 胡连等 3 人 21(1997)995
- 胡妙君 利用加速器质谱计测量 ^{10}Be 形成截面 刘联璠等 6 人 19(1995)786
- 胡琼辉 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 胡诗可 Polyakov-Kleinert 弦的静态夸克势研究 姜涛等 2 人 17(1993)119
 两维引力中的一种可积模型 颜骏等 3 人 17(1993)322
 亏格 g Riemann 曲面上比热的模对偶性质 颜骏等 2 人 17(1993)534
 Raby 宇宙中的非阿贝尔蛙洞解 颜骏等 3 人 17(1993)605
 10 维超引力模型的稳定紧致化 颜骏等 2 人 17(1993)692
- 胡涛 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 核探测器中混合气配制新方法 王运永等 6 人 18(1994)1
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李金等 11 人 19(1995)209
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 胡晓庆 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 $46.7\text{MeV}/u$ $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268

- 46.7MeV / u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
- 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
- 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
- 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
- $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
- 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au 、 ^{115}In 、 ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 20(1997)15
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 胡 源 高能碰撞多粒子末态间歇现象与关联积分的研究 张 阳等 5 人 18(1994)621
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 核-核碰撞间歇现象的混合效应 胡 源等 3 人 21(1997)604
- 胡占宁 三维精确可解格点模型 18(1994)813
- 三维精确可解统计模型——Baxter-Bazhanov 模型的可积性条件 胡占宁等 2 人 19(1995)123
- 胡志强 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
- ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
- 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- 新核素 ^{65}Se 半衰期的首次实验测定 黄文学等 4 人 20(1996)113
- 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- 华 辉 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
- 黄博文 有效屏蔽势的能级和波函数 黄博文等 2 人 21(1997)757
- 黄德强 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673

- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 黄发决 中子与 α 相互作用的两体等效可分离势 裘志洪等 5 人 17(1993)845
- 黄良鑫 $SU(2) \times SU(2)$ 格点手征模型的进一步研究 黄良鑫等 3 人 19(1995)245
- 黄懋容 掺硫和在不同温度下 InP 的正电子湮没研究 黄懋容等 6 人 20(1996)1097
- 黄敏 北京自由电子激光 Wiggler 中电子轨迹偏离的改进 黄敏等 5 人 18(1994)1137
- 黄庆 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 黄胜年 ^{252}Cf 冷裂变瞬发 γ 射线 韩洪银等 4 人 19(1995)8
- 黄涛 QCD 中等时方程的赝标介子解 卞建国等 2 人 18(1994)127
- BSW 方案中的模型相关性 罗传望等 5 人 18(1994)601
- 判别分析法在北京谱仪粒子分辨中的应用 姜志进等 4 人 18(1994)1064
- 北京谱仪中的初级顶点拟合 姜志进等 3 人 19(1995)1
- 黄唯志 核的自旋横向响应函数 王子兴等 2 人 17(1993)367
- 关于 $M=3Y$ 力等效 G 矩阵元在重核区的有效性 程岚等 3 人 20(1996)246
- 黄惟承 $N=4$ 超对称量子力学 黄惟承等 2 人 19(1995)812
- 黄文达 实验测定 ^{183}Os 的 $Q_{\beta c}$ 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
- 黄文学 ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
- 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- 新核素 ^{65}Se 半衰期的首次实验测定 黄文学等 4 人 20(1996)113
- 对 ^{69}Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
- 合成和研究滴线区新核素 β 延迟质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 黄无量 大数猜想与暗物质 20(1996)409
- 暗物质粒子的质量与物态 21(1997)316
- 黄小临 中能重离子碰撞中线动量耗散动力学 黄小临等 5 人 18(1994)154
- 黄小龙 $(n, 2n)$ 反应同质异能态截面比 黄小龙等 2 人 21(1997)453
- 黄秀萍 Z^0 能区正负电子湮没强子多重数分布及有关参数 谢一冈等 4 人 20(1996)972
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 黄因智 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97

- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \overline{KK}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\eta/\eta'(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 北京 τ -c 工厂 (BTCF) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
黄永畅 “不可约性假设”的证明及应用 邹鹏程等 2 人 19(1995)796
黄永章 用于微波电子枪注入器的 α 磁铁的设计和制造 黄永章等 3 人 17(1993)790
 等梯度加速结构瞬时束流负载效应的计算 黄永章等 2 人 18(1994)310
 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 用于微波电子枪的双重入腔及其阴极结构 黄永章等 2 人 18(1994)658
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
黄宇营 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13
 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
 同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
黄志斌 束流传输管道孔径变化引起的束团场能差 陈银宝等 3 人 20(1996)571
 直线加速器中双向高斯密度分布电荷束团发射度增长的比率关系 陈银宝等 3 人 21(1997)657
惠 萍 $(2+1)$ 维 $SU(2)$ 真空波函数四级近似的解析计算 惠 萍等 2 人 19(1995)820
 $(2+1)$ 维 $SU(2)$ 格点规范场胶球质量的解析计算 惠 萍等 3 人 20(1996)55
 $2+1$ 维 $SU(2)0^{++}$ 胶球波函数的四级近似 胡 连等 3 人 21(1997)995
惠 源 有限温度下赝标耦合中的 η 介子 高守恩等 4 人 18(1994)148
霍安祥 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 从高山乳胶室族事例研究强相互作用在碎裂区的特征 陈江川等 4 人 19(1995)494
 太阳大耀斑期间甚高能粒子流强增加的一种机制 霍安祥等 2 人 20(1996)1068
 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
霍俊德 $^{171}\text{Lu } 1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
霍 雷 相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511
 π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630
 多粒子玻色关联对夸克胶子等离子体颗粒源的检测 张卫宁等 6 人 19(1995)148
 高能重离子碰撞中末态粒子的极角分布 霍 雷等 6 人 20(1996)311
 多 π 关联对 π 发射源相干性的分析 张卫宁等 5 人 20(1996)707
 高能重离子碰撞中末态粒子分布的非对称性 霍 雷等 5 人 20(1996)812
霍裕昆 Fermi 能区核-核碰撞的平衡前中子发射 王志松等 2 人 18(1994)848

J

- 吉桂芳 FeCl⁺轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
- 季达人 集团蒙特卡罗方法对一维量子 X-Y 模型的研究 季达人等 4 人 19(1995)42
- 季刚 相对论核-核碰撞中产生的 Λ 粒子的横向极化度与横向动量的关联 叶云秀等 5 人 20(1996)685
- 贾焕玉 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 甚高能区宇宙线流强气象效应的分析 贾焕玉等 3 人 18(1994)788
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 贾秋萍 J/ ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 姜春华 J/ ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 用小角度 Bhabha 事例谱形分析方法确定北京谱仪亮度 朱启明等 4 人 17(1993)1057
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
- J/ ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ $\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 姜焕清 η_c -核束缚态 姜焕清等 2 人 17(1993)1021
- 高能核碰撞中的 K^+/π^+ 比与次级碰撞效应 刘 波等 2 人 18(1994)180
- 核上 A(π, η)X 单举反应 陈 林等 2 人 18(1994)553
- 核物质中 π 介子引起的粒子-空穴和 Δ -空穴激发 刘良钢等 3 人 18(1994)1027
- 初态相互作用与高能 p-A 碰撞中 J/ ψ 产额的压低 覃克宇等 3 人 20(1996)1003
- ρ - ω 混合和介质中的中子-质子质量差 刘 波等 4 人 21(1997)953
- 姜绍周 核激子态的瞬时概率分布和非平衡熵 潘忠诚等 4 人 17(1993)444
- K^+ 核散射与非线性密度相关修正 闵德芬等 6 人 17(1993)462
- 不同激发能的 ^{208}Pb 核的非平衡态的概率分布与熵 潘忠诚等 3 人 19(1995)757
- 姜 涛 Polyakov-Kleinert 弦的静态夸克势研究 姜 涛等 2 人 17(1993)119
- 姜晓明 三角形弯晶单色器的分光及聚焦特性研究 郑文莉等 5 人 19(1995)858
- 北京同步辐射装置 X 射线漫散射实验站及准周期非晶多层膜的 X 射线非镜面散射研究 姜晓明等 6 人 20(1996)460
- 姜印琳 宇宙线 μ 子的大气契伦柯夫光像 19(1995)110

- 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
- 姜志进 判别分析法在北京谱仪粒子分辨中的应用 姜志进等 4 人 18(1994)1064
北京谱仪中的初级顶点拟合 姜志进等 3 人 19(1995)1
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
核-核碰撞的独立源模型及中心快度区末态产生粒子横能量分布 姜志进等 3 人 19(1995)508
 $U(1)$ 规范理论的定量分析 阎循领等 3 人 19(1995)527
- 江栋兴 中能重离子碰撞中线动量耗散动力学 黄小临等 5 人 18(1994)154
垒下 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 裂变碎片角关联模拟 钱 兴等 6 人 18(1994)385
 $\phi 76\text{mm} \times 100\text{mm}$ BGO 闪烁探测器探测效率测量 刘 昕等 5 人 18(1994)496
近垒及垒下 $^{12}\text{C} + ^{93}\text{Nb}$ 的蒸发剩余核截面 钱 兴等 5 人 19(1995)603
 $25\text{MeV} / \text{u}$ $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
 $25\text{MeV} / \text{u}$ $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$, ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 江光佐 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 江俊勤 带 Wilson 费米子的格点 Schwinger 模型中 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle$ 的变分研究 许国材等 3 人 17(1993)1011
带有质量的 Wilson 费米子的格点 Schwinger 模型中 M_{ψ} 对 m 的变化率的计算 江俊勤等 3 人 18(1994)222
- 江向东 $Z \rightarrow 3\gamma$ 和 $\gamma\gamma \rightarrow \gamma\gamma$ 极化张量的一般形式 江向东等 2 人 17(1993)898
包含轻子结构的夸克模型 刘耀阳等 3 人 20(1996)900
- 蒋海音 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
- 蒋建华 BSRF 白光动态形貌实验系统 王功利等 5 人 21(1997)763
- 蒋玉楨 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
碰撞 1.2A GeV $\text{Ar} + \text{KCl}$ 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人 17(1993)912
多粒子玻色关联对夸克胶子等离子体颗粒源的检测 张卫宁等 6 人 19(1995)148
高能重离子碰撞中末态粒子的极角分布 霍 雷等 6 人 20(1996)311
- 焦善庆 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人
- 揭泉林 q 类似玻色算符的逆算符及其应用 韦联福等 3 人 21(1997)1031
- 金柏琪 $L^{\pm}$ 算符和量子包络代数 谢 汨等 3 人 20(1996)617
- 金炳年 L3 中心径迹室顶点位置分辨的改进 杨长根等 5 人 18(1994)687
L3 实验测量 τ 寿命的拟合方法及其误差讨论 杨长根等 5 人 18(1994)794
- 金长浩 对称弱混合的可能性及其意义 17(1993)710
- 金寒涓 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘 忠等 14 人 21(1997)881
HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 金 山 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193

- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
金太浩 全同超形变带转动惯量的粒子数守恒计算 金太浩等 3 人 18(1994)239
金卫阳 600 MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
 25 MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
 25 MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{nat}\text{Ag}$ 、 ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
金亚平 有限温度 QCD 求和规则与 ρ 介子 刘觉平等 2 人 19(1995)1108
金 艳 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
金玉明 储存环聚焦结构设计中的比例定律 21(1997)75
金运范 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
靳根明 46.7 MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
 ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
 $^{16}\text{O} + ^{115}\text{In}$ 反应的全熔合与非完全熔合 李文新等 5 人 18(1994)481
 25 MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25 MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
 20—46 MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
 双幻核 ^{100}Sn 的基态性质 文万信等 3 人 20(1996)148
 25 MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304

- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
- 单极巨共振弛豫过程 文万信等 3 人 20(1996)546
- 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
- 用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$, ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 100MeV / u Au + Au 对心碰撞中心集体流的发展 郝鸿飞等 5 人 21(1997)728
- 晋青珍 BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
- 荆贵茹 200A GeV ^{32}S 与 Cu 作用产生的重碎片的角分布 荆贵茹等 2 人 17(1993)976
- p-A 作用的非弹性度及对靶核质量的依赖 荆贵茹等 4 人 18(1994)1057
- 经才驷 强子相互作用中次级粒子纵向动量对多重数的依赖 经才驷等 2 人 18(1994)865
- p-A 作用的非弹性度及对靶核质量的依赖 荆贵茹等 4 人 18(1994)1057
- 井孝功 RPA 的复数本征解与相变 姚玉洁等 4 人 17(1993)757
- Hartree-Fock 解多重性的研究 井孝功等 5 人 17(1993)1026
- 一个微观两参数核模型和它对超铀区核 Y_{rast} 线的应用 吴连勋等 3 人 20(1996)182
- 景毓辉 三角形弯晶单色器的分光及聚焦特性研究 郑文莉等 5 人 19(1995)858
- 北京同步辐射装置 X 射线漫散射实验站及准周期非晶多层膜的 X 射线非镜面散射研究 姜晓明等 6 人 20(1996)460
- 敬克兴 20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
- 巨新 氟化锂团簇基纳米相薄膜的慢正电子研究 巨新等 5 人 21(1997)844

K

- 康书辉 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J / ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J / ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J / ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J / $\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J / ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 柯永丰 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 柯尊建 J / ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- J / ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 孔登明** 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 孔祥忠** 几个 $(n, d^*), (n, t)$ 和 (n, n', α) 反应截面的测量 王永昌等 4 人 17(1993)289
- $\text{Ba}(n, x)^{134}\text{Cs}, ^{134}\text{Ba}(n, 2n)^{133}\text{Ba}, ^{140}\text{Ce}(n, 2n)^{139}\text{Ce}, ^{142}\text{Ce}(n, 2n)^{141}\text{Ce}$ 和 $^{23}\text{Na}(n, 2n)^{22}\text{Na}$ 反应截面的测量 孔祥忠等 4 人 19(1995)781
- 匡乐满** 李超代数 $B(0,1)$ 的超相干态表示 匡乐满等 2 人 17(1993)215
- 况浩怀** 太阳大耀斑期间甚高能粒子流强增加的一种机制 霍安祥等 2 人 20(1996)1068
- 况蕙孙** $R(5)$ 群 Casimir 算子对核子 JT 耦合态的进一步分类 陈健华等 4 人 19(1995)424
- 邝宇平** 现实的一代 ETC 模型对 $Zb\bar{b}, Z\tau^+\tau^-$ 顶角的辐射修正 岳崇兴等 3 人 20(1996)997

L

- 拉巴次仁** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 赖元芬** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 蓝其开** 强子-强子碰撞中平均横动量随多重数变化的能量关联与三火球模型 蓝其开等 2 人 17(1993)934
- 强子碰撞中平均横动量的多重数分布随截断的变化 蓝其开等 2 人 19(1995)826
- 兰慧彬** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385

- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 郎鹏飞 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 雷传衡 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈宇等 8 人 17(1993)673
 雷春红 有限温度 $U(1)$ 格点规范模型的高阶累积展开之研究 郑希特等 4 人 17(1993)1076
 雷怀宏 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
 TR4终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
 大动态范围二维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
 RIBLL1终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
 雷祥国 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 ^{162}Lu 的高自旋态及 $A=160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
 HIFRL首次束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976

- 雷奕安 Hg 和 Pb 超变形带的精确计算 雷奕安等 2 人 17(1993)636
轴对称变形核中配对粒子态的构成 曾谨言等 3 人 19(1995)834
全同多准粒子转动带的内部结构 雷奕安等 3 人 21(1997)227
超变形转动带的自旋指定与实验测定的比较 雷奕安等 3 人 21(1997)648
- 黎刚 北京同步辐射装置软 X 光束线通量谱的绝对测量与计算 崔明启等 6 人 20(1996)847
- 李安利 ^{252}Cf 冷裂变瞬发 γ 射线 韩洪银等 4 人 19(1995)8
- 李波 一个简单的 K^+N 二体势 宁平治等 3 人 17(1993)152
- 李灿国 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 李长林 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
- 李长松 二维情况下内部有质量费米子单圈图对 Casimir 力的贡献 郑泰玉等 2 人 20(1996)211
- 李澄 倾斜多丝正比室辐射状阴极条感应电荷重心读出的定位性能研究 汪兆民等 4 人 17(1993)685
气体雪崩过程中光电信号的时间关联 许咨宗等 4 人 19(1995)775
气体雪崩放电的单光子测量时间谱 韩家祥等 5 人 20(1996)885
闪烁光纤光传输特性的研究 汪晓莲等 7 人 21(1997)787
- 李承泽 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 李大仕 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 李芳 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+\tau^-\rightarrow\pi^+\pi^-\pi^+\pi^-\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S)\rightarrow\pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S)\rightarrow\rho\pi$ 及 $\psi(2S)\rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+\rightarrow\pi^++n\pi^0+\nu_\tau$ ($n=0,1,2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 李光城 同步辐射小角散射实验站 董宝中等 4 人 19(1995)284
同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
- 李光华 q 变形带电 Fermion 相干态和 q' 变形的 $SU(3)$ 电荷、超荷 Fermion 相干态 郝三如等 3 人 18(1994)919
- 李光晓 在北京正负电子对撞机上采用小包络函数永久磁铁方案的可行性 李光晓等 2 人 19(1995)952
- 李广生 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
 ^{128}Ce 16^+ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
 ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
- 李桂生 $50\text{MeV}/u$ ^{12}C 离子实验靶区出射中子角分布实验测量 李桂生等 6 人 17(1993)499
在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577

- 高能重离子加速器次级中子屏蔽的理论估算 20(1996)854
- 李海波 PGBs 对高能 e^+e^- 湮没产生顶夸克对的单圈量子效应 鲁公儒等 3 人 20(1995)522
北京 τ -c 工厂 (BTCF) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- 李红 $SU(2) \times SU(2)$ 格点手征模型的进一步研究 黄良鑫等 3 人 19(1995)245
- 李焕铁 SQS 机制另一可能的解释 17(1993)8
小间隙高放大多丝室及其放电机制 王继华等 10 人 18(1994)107
- 李辉东 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
- 李积梅 Fermi-Dirac 关联与 $Q^-K_s(Q)$ 分布 戴启润等 4 人 20(1996)1014
- 李佳 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 李家华 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 李家荣 高能不等核碰撞和弛豫时间的 Fokker-Planck 方程描述 白 鸽等 3 人 17(1993)57
在有限温度下手征孤子的消失与手征相变 邓胜华等 2 人 17(1993)140
高能不等核碰撞和弛豫时间的相对论动力论方程描述 白 鸽等 2 人 18(1994)166
快度中心区强子物质输运系数和粘滞流体演化 张晓飞等 2 人 18(1994)172
QGP 中反应过程的内线统计效应 高 嵩等 2 人 18(1994)229
F-L 模型的状态方程与退禁闭相变图象 邓胜华等 2 人 18(1994)424
高温下弱电相变的自洽研究 侯德富等 2 人 18(1994)928
超越阿贝尔优势近似和色等离子体的输运系数计算 张晓飞等 2 人 18(1994)1043
核-核碰撞的独立源模型及中心快度区末态产生粒子横能量分布 姜志进等 3 人 19(1995)508
有限温度下非拓扑孤子模型的双圈有效势 邓胜华等 3 人 19(1995)713
热场动力学中的切割图方法及热格林函数的虚部 侯德富等 2 人 19(1995)891
在弛豫时间近似下 QGP 中夸克输运系数的一种计算 白 鸽等 2 人 19(1995)898
任意规范下有限温度二圈 QED 热力学势及其交叉发散 侯德富等 2 人 19(1995)998
夸克胶子等离子体中的次带头阶得拜屏蔽质量 侯德富等 2 人 20(1996)533
关于 QGP 中夸克屏蔽位势来自动力论方程的研究 白 鸽等 2 人 20(1996)801
虚时温度场论中的维数正规化及 QED 二圈热力学势 王 欣等 2 人 21(1997)216
QGP 中夸克静电波辐射研究 白 鸽等 2 人 21(1997)1011
- 李建平 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈 宇等 8 人 17(1993)673
- 李建唐 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 李金 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 李金屏** BSW 方案中的模型相关性 罗传望等 5 人 18(1994)601
- 李金玉** 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486
 超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
- 李珏忻** 国家同步辐射实验室周围辐射场特点及相应监测方法 李裕熊等 3 人 21(1997)81
- 李君清** 在量子分子动力学模型中与 N, Z 有关的宏观势对碎片形成的影响 李君清等 4 人 18(1994)379
 用改进的量子分子动力学研究中能重离子碰撞中多重碎裂 刘 航等 4 人 19(1995)1040
 多重碎裂和相互作用势的涨落 李君清等 5 人 20(1996)332
 对中能重离子碰撞碎块形成过程中核结构效应的研究 刘 航等 3 人 20(1996)723
 在中能重离子反应中核子的运动特征 李君清等 4 人 20(1996)839
 经典粒子在轴对称八极形变势场中的混沌运动 21(1997)818
- 李 磊** $2+1$ 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的红外形式 陈启洲等 4 人 18(1994)37
 $2+1$ 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的研究 陈启洲等 4 人 18(1994)417
- 李黎力** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 李立华** 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 李盘林** 在膨胀夸克-胶子等离子体相变过程中包含夸克碎块效应的动力学 李盘林等 3 人 21(1997)918
- 李佩琴** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 李启明** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 李 强** 低能电子径迹中能量沉积频率分布 李 强等 3 人 19(1995)1078
 液态水中重离子径向剂量分布的计算 李 强等 3 人 20(1996)476

- 重离子 Bragg 峰的研究及其应用 李 强等 4 人 21(1997)571
- 李清润 K^+ 核散射与非线性密度相关修正 闵德芬等 6 人 17(1993)462.
 Eikonal 近似在大角度一定不好吗? 杨永栩等 2 人 17(1993)469
 中能区质子与 ^4He 原子核散射的唯象全振幅 李清润等 2 人 17(1993)918
 高能 α 粒子与 ^4He 的弹性散射 何淦明等 2 人 17(1993)925
 α 粒子散射对 ^{16}O 集团结构的检验 李清润等 2 人 18(1994)439
 碳重离子散射研究 李清润等 2 人 18(1994)748
 通过 $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C}$ 散射对两种不同模型的一个比较 李清润等 2 人 18(1994)1115
 $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C}$ 散射激发函数 李清润等 2 人 19(1995)374
 $^{16}\text{O} + ^{12}\text{C}$ 系统的折叠模型 李清润等 2 人 20(1996)277
 124MeV 下 $^{16}\text{O} + ^{16}\text{O}$ 弹性散射的折叠模型 杨永栩等 2 人 21(1997)645
- 李庆林 利用 $SU(2)_{q,s}$ 量子代数的两参数变形振子实现讨论 $SU(2)_{q,s}$ 相干态 于肇贤等 4 人 19(1995)258
- 李 群 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 李如柏 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

- 李生岗 $^{128}\text{Ce}16^+$ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
- 李世清 用 CHHE-MRT 方法研究 $3-\alpha$ 集团基态 李世清等 3 人 17(1993)1116
- 李 松 $A \sim 190$ 区超形变带的 $\Delta I = 4$ 分岔 吴崇试等 3 人 20(1996)1028
- 李松林 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
- $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
- $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
- 耗散反应产物的电荷扩散与能量相干 卢 俊等 6 人 21(1997)825
- 李惕碛 小样本时皮尔森 χ^2 量概率分布的讨论 吴 枚等 4 人 18(1994)879
- 李铁忠 Skyrme 模型中的一个问题及其简单的讨论 17(1993)807
- 李伟生 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
- 李 蔚 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 李卫东 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 李卫国 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 北京谱仪主漂移室的径迹重建 毛泽普等 5 人 17(1993)193
- e/π 识别的 dE/dx 方法在北京谱仪 τ 重轻子质量测量中的应用 荣 刚等 6 人 17(1993)865

- 过程 $J/\psi \rightarrow \gamma X$, $X \rightarrow P_1 P_2$ 中 X 自旋的矩分析法 陈申见等 3 人 17(1993)961
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 李文健** $50\text{MeV}/u$ ^{12}C 离子实验靶区出射中子角分布实验测量 李桂生等 6 人 17(1993)499
- 重离子 Bragg 峰的研究及其应用 李强等 4 人 21(1997)571
- 李文新** $42\text{MeV}/u$ ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
- $^{16}\text{O} + ^{115}\text{In}$ 反应的全熔合与非完全熔合 李文新等 5 人 18(1994)481
- $135\text{MeV}/u$ ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦芝等 6 人 19(1995)481
- $40\text{MeV}/u$ ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 4 人 19(1995)991
- $20-46\text{MeV}/u$ ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
- $6.3-24.6\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{187}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张翔等 9 人 20(1996)21
- 李锡霞** ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 李希国** 重离子碰撞两体关联输运理论 I. 理论模型: 相干态表象的构造与基本运动方程 刘建业等 5 人 20(1996)1007
- 重离子碰撞两体关联输运理论 II. 使用变分原理确定单粒子态的演化方程和反对称分子动力学 李希国等 3 人 21(1997)162
- 重离子碰撞两体关联输运理论 III. 半经典近似下的数值计算 刘航等 5 人 21(1997)169
- 李晓光** 金属玻璃 $\text{Pd}_{79.5}\text{Ni}_4\text{Si}_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
- 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
- 李小南** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961

- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 李欣年 FeCl^+ 轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
 李新华 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 李秀林 荷电标量介子对光子与光子散射振幅贡献的精确解析表达式 杨茂志等 3 人 19(1995)727
 李学军 北京正负电子对撞机(BEPC)4W1A 光束线光束中心监测与 X 光激发荧光信噪比的观测
 洪 蓉等 5 人 17(1993)403
 李学潜 利用具有两个 Higgs-doublets 的扩展标准模型对 LEP II 能量下 $t\bar{c}$ 产生过程的研究 张肇西等 4 人 17(1993)1081
 在 LEP II 及 NLC 能量下 $e^+e^- \rightarrow b\bar{b}Z^0$ 和 $t\bar{t}Z^0$ 过程中 Higgs 粒子的观测效应 丁亦兵等 5 人 20(1996)982
 李训贵 ^6Li 超核的基态能量 18(1994)81
 李亚南 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 李延国 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
 李扬国 中能区反质子与原子核的弹性散射 17(1993)829
 中能区反质子与核的非弹性散射 18(1994)186
 中能区反质子与核非弹性散射的自旋效应 18(1994)466
 低能反质子的核散射与 Glauber 理论 李扬国等 2 人 19(1995)348
 反质子与核的电荷交换反应和非弹性散射 20(1996)1021
 镜核间的反质子与核的电荷交换反应 21(1997)554
 李银万 完全可积 $O(3)-\sigma$ 模型与 r, s 矩阵 李银万等 3 人 18(1994)518
 李永贵 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 北京自由电子激光 Wiggler 中电子轨迹偏离的改进 黄 敏等 5 人 18(1994)1137
 李 勇 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 李有猛 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763

- 李玉良 有限温度 $U(1)$ 格点规范模型的高阶累积展开之研究 郑希特等 4 人 17(1993)1076
- 李玉山 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 李玉晓 1 + 1 维 $U(1)$ Higgs 模型 Non-contractable loop 和 Sphaleron 李玉晓等 3 人 18(1994)1003
- 李裕熊 国家同步辐射实验室周围辐射场特点及相应监测方法 李裕熊等 3 人 21(1997)81
- 李 云 多粒子模拟方法分析北京正负电子对撞机储存环束团长度拉伸效应 李 云等 2 人 20(1996)950
- 李云德 HERA 硬光生过程中的光子产生 李云德等 2 人 20(1996)505
 HERA 分解光子过程中的双喷注产生 李云德等 2 人 20(1996)601
- 李 泽 近垒及垒下 $^{12}\text{C} + ^{93}\text{Nb}$ 的蒸发剩余核截面 钱 兴等 5 人 19(1995)603
 20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
- 李占奎 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 ($\text{EC} + \beta^+$) 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)285
 合成和研究滴线区新核素 β 延发质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 李志兵 2 + 1 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的红外形式 陈启洲等 4 人 18(1994)37
 2 + 1 维 $SU(2)$ 规范场真空波函数的研究 陈启洲等 4 人 18(1994)417
- 李志常 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
- 李重生 在 $Z \rightarrow b\bar{b}$ 衰变中 Gluino 和 Squark 的质量效应 胡炳全等 4 人 17(1993)44
- 李祝霞 相对论重离子反应的热化过程 李祝霞等 4 人 18(1994)559
 中高能质子与核碰撞反应机制的研究 卢兆启等 2 人 18(1994)647
 用相对论 VUU 研究平均场和核子-核子截面对高能和中能集体流的影响 周洪波等 3 人 19(1995)156
 核内核子-核子非弹散射截面(I) 茅广军等 4 人 19(1995)540
 核内核子-核子非弹散射截面(II) 茅广军等 4 人 19(1995)628
 Δ 粒子的相对论 BUU 方程 茅广军等 3 人 20(1996)826
 核内核子与 Δ 粒子的散射截面 茅广军等 3 人 20(1996)925
 核内 Δ 吸收截面 茅广军等 4 人 20(1996)1053
- 李子平 奇异拉氏量系统的正则对称性和 Ward 恒等式 18(1994)694
 Noether 恒等式的推广及其应用 19(1995)320
 广义 QCD 中正则形式的 Ward 恒等式 19(1995)405
 动力系统的正则量子对称性质 19(1995)1012
 相空间路径积分中的 Feynman 规则和广义 Ward 恒等式 20(1996)698
 奇异拉氏量系统相空间路径积分中的整体对称性 21(1997)34
 规范理论中的量子守恒荷 高海啸等 2 人 21(1997)506
- 李宗强 50MeV / u ^{12}C 离子实验靶区出射中子角分布实验测量 李桂生等 6 人 17(1993)499
- 李宗伟 47MeV / u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应碘同位素的产额测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479

- 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
- ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
- 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
- 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
- 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 李祖豪** 400GeV/c pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
- 400GeV/c pp 碰撞多粒子产生的分形行为 王韶舜等 6 人 18(1994)975
- 400GeV/c pp 碰撞产生粒子的方位角结构 王韶舜等 6 人 20(1996)297
- 硅光电二极管作为 CsI(Tl)晶体读出元件的实验研究 何景棠等 5 人 20(1996)890
- CsI(Tl)晶体的辐照损伤研究 何景棠等 5 人 21(1997)21
- 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 李祖玉** 46.7MeV/A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
- 25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
- $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV/u)产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
- 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
- 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
- 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
- 25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
- 25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
- 中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
- 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
- 热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
- 25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{nat}\text{Ag}$ 、 ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 李作宏** $SU(3)$ 下的美介子半轻子衰变 李作宏等 2 人 18(1994)715
- $U(1)$ 规范理论的定量分析 阎循领等 3 人 19(1995)527
- 厉光烈** 小 x 区域部分子演化模型的改进 于明俭等 3 人 17(1993)861
- 夸克激发与质子自旋 沈洪清等 6 人 18(1994)277
- 改进的部分子演化模型及其对 EMC 效应和核 Drell-Yan 过程的解释 于明俭等 5 人 18(1994)1107
- 非微扰夸克传播子与核子结构函数的非平庸 Q^2 依赖性研究 杨建军等 3 人 21(1997)146
- 推广 x 重新标度模型与核内核子的胶子分布函数 段春贵等 4 人 21(1997)433
- 改进的 Q^2 -重标度模型与部分子分布函数的核效应 姚晓霞等 5 人 21(1997)548
- 统一描述 EMC 效应, 核 Drell-Yan 过程和 J/ψ 光生过程的一个简单模型 朱亚波等 2 人 21(1997)806
- 力 京** 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线‘膝’区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
- 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
- 梁碧芳** 利用 $SU(2)_{q,s}$ 量子代数的两参数变形振子实现讨论 $SU(2)_{q,s}$ 相干态 于肇贤等 4 人 19(1995)258
- 梁东麒** 对电子中微子质量为虚数的质疑 庆承瑞等 6 人 19(1995)27
- 梁 红** 超对称系统的边界条件与可积性 岳瑞宏等 2 人 20(1996)514
- 梁化楼** 用神经网络分辨原初宇宙线成份 梁化楼等 5 人 21(1997)205
- 廖伯琴** Hf 高自旋态推转壳模型 PNC 方法研究 林辛未等 3 人 19(1995)359

- 廖继志 带三体势的 IBM1 的 $O(6)$ 极限对偶偶 Pt 核的应用 王黄生等 2 人 18(1994)91
 双准自旋模型的严格好准自旋态能谱 18(1994)637
 $A = 160$ 号区部分奇奇核的晕带能谱计算 朱顺泉等 4 人 20(1996)455
 PDHF 方法应用于 f_7 奇 A 核 ^{47}Ti 、 ^{47}V 、 ^{47}Cr 、 ^{49}Cr 的能谱研究 韩 勇等 2 人 21(1997)541
- 林承键 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
 垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
 预平衡裂变 刘祖华等 6 人 20(1996)107
 $^{19}\text{F} + ^{208}\text{Pb}$ 近垒及垒下准弹反应 林承键等 6 人 21(1997)872
- 林纯镇 超变形转动带的自旋指定与实验测定的比较 雷奕安等 3 人 21(1997)648
- 林福民 关于 β 稳定线公式的一个评注 林福民等 3 人 18(1994)745
- 林 海 α 模型的改进和 Levy 指数的解析计算 林 海等 3 人 18(1994)858
 高能碰撞二维相空间自仿射分形的解析研究 林 海等 3 人 20(1996)65
 二维相空间的自仿射分形一维投影的解析研究 林 海等 2 人 20(1996)625
 一维投影 α 模型的子波关联 林 海等 2 人 21(1997)513
- 林建锋 Z^0 能区正负电子湮没强子多重数分布及有关参数 谢一冈等 4 人 20(1996)972
- 林进虎 Skyrme 模型中新的附加质量项对重子及其共振态的影响 林进虎等 3 人 17(1993)38
- 林 军 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 林俊松 近垒及垒下 $^{12}\text{C} + ^{93}\text{Nb}$ 的蒸发剩余核截面 钱 兴等 5 人 19(1995)603
 $25\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
- 林绍波 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 林树子 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 林 薇 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 林辛未 HF 高自旋态推转壳模型 PNC 方法研究 林辛未等 3 人 19(1995)359
 $A = 160$ 号区部分奇奇核的晕带能谱计算 朱顺泉等 4 人 20(1996)455
- 林雅芳 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 林郁正 混频 $1/2 + m$ 腔微波电子枪束流动力学特性 赵振堂等 3 人 18(1994)664
 热阴极微波电子枪模拟计算 唐传祥等 3 人 20(1996)376
 用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378

- 多腔热阴极微波电子枪的实验研究 唐传祥等 6 人 21(1997)470
- 林源根** RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 林仲金** 关于 $\mathbb{P}$ 的结构模型(部分子分布)的检验 何祯民等 4 人 19(1995)310
推广 x 重新标度模型与核内核子的胶子分布函数 段春贵等 4 人 21(1997)433
- 凌寅生** 从始态到准稳态过程的数字描述 顾建中等 2 人 17(1993)835
- 刘备书** 格点变模 $SU(2)$ -Higgs 模型的解析计算 刘备书等 2 人 19(1995)1090
- 刘 波** 高能质子-核和核-核碰撞中末态作用对 K^+/π^+ 比的影响 17(1993)455
高能核碰撞中的 K^+/π^+ 比与次级碰撞效应 刘 波等 2 人 18(1994)180
胶子遮蔽和末态作用对 p-A 碰撞中粲偶素和 b 夸克偶素产额压低的贡献 刘 波等 2 人 18(1994)443
相对论重离子碰撞中 J/ψ 吸收截面的分析 刘 波等 2 人 18(1994)652
高能 p-A 碰撞中横能量分布的几何模型分析 刘 波等 2 人 18(1994)1096
相对论重离子碰撞中粲偶素产额的横能依赖关系 赵维勤等 2 人 19(1995)49
粲夸克偶素和 b 夸克偶素的色屏蔽和分解 刘 波等 2 人 20(1996)153
初态相互作用与高能 p-A 碰撞中 J/ψ 产额的压低 覃克宇等 3 人 20(1996)1003
QGP 中的热胶子质量和 J/ψ 、 ψ' 的分解 高 嵩等 3 人 21(1997)322
 ρ - ω 混合和介质中的中子-质子质量差 刘 波等 4 人 21(1997)953
- 刘昌龙** Ar 离子辐照非晶态合金表面发泡和针孔形成研究 刘昌龙等 4 人 20(1996)763
Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
- 刘大鸣** 近垒及垒下 $^{12}\text{C} + ^{93}\text{Nb}$ 的蒸发剩余核截面 钱 兴等 5 人 19(1995)603
- 刘 峰** 高能碰撞中喷注判定法的研究 刘 明等 4 人 21(1997)138
高能强子-强子碰撞中硬软过程的比较分析 柳 峰等 2 人 21(1997)330
强子-强子碰撞中硬分量存在的又一实验证据 刘红平等 4 人 21(1997)609
- 刘福虎** 高能核-核碰撞的靶核黑碎片发射 刘福虎等 2 人 17(1993)494
高能轻子-核碰撞中簇射粒子的研究 刘福虎等 2 人 18(1994)208
相对论性核-核碰撞中的弹核碎片多重数与角分布 刘福虎等 2 人 18(1994)334
相对论性重离子碰撞中负粒子的横动量和横快度分布 刘福虎等 2 人 18(1994)1073
中能原子核多重碎裂中的方位角关联 19(1995)217
- 刘福庆** 用 CHHE-MRT 方法研究 $3-\alpha$ 集团基态 李世清等 3 人 17(1993)1116
- 刘 刚** 一个描述轴对称、过滤核 yrast 带的新公式及核 γ 形变的一个特征量 吴连勋等 2 人 20(1996)339
- 刘功淳** 三角形弯晶单色器的分光及聚焦特性研究 郑文莉等 5 人 19(1995)858
北京同步辐射装置 X 射线漫散射实验站及准周期非晶多层膜的 X 射线非镜面散射研究 姜晓明等 6 人 20(1996)460
- 刘冠华** 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 $46.7\text{MeV}/u$ $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
CsI(Tl) + 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481

- 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
- 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au , ^{115}In , ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
- 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
- RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
- 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
- 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 刘桂民 ^{11}Li 的中子晕结构 段宜武等 2 人 18(1994)736
- 刘国兴 $^{16}\text{O} + ^{m}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
- 600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
- 6.3—24.6MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{m}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张 翔等 9 人 20(1996)21
- 非全熔合反应裂变角分布 刘国兴等 4 人 21(1997)777
- 刘 航 用改进的量子分子动力学研究中能重离子碰撞中多重碎裂 刘 航等 4 人 19(1995)1040
- 多重碎裂和相互作用势的涨落 李君清等 5 人 20(1996)332
- 对中能重离子碰撞碎块形成过程中核结构效应的研究 刘 航等 3 人 20(1996)723
- 重离子碰撞两体关联输运理论 I. 理论模型: 相干态表象的构造与基本运动方程 刘建业等 5 人 20(1996)1007
- 重离子碰撞两体关联输运理论 II. 使用变分原理确定单粒子态的演化方程和反对称分子动力学 李希国等 3 人 21(1997)162
- 重离子碰撞两体关联输运理论 III. 半经典近似下的数值计算 刘 航等 5 人 21(1997)169
- 刘洪民 几率分布指数率与间歇现象 张孝泽等 6 人 18(1994)160
- 刘洪涛 中能重离子碰撞中线动量耗散动力学 黄小临等 5 人 18(1994)154
- ϕ 76mm $\times$ 100mm BGO 闪烁探测器探测效率测量 刘 昕等 5 人 18(1994)496
- 刘洪业 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
- ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
- 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
- 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
- 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 刘红平 强子-强子碰撞中硬分量存在的又一实验证据 刘红平等 4 人 21(1997)609
- 刘怀民 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97

- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 北京 τ -c 工厂 (BTCL) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 刘建飞 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13
- 北京同步辐射装置 X 射线衍射实验站在材料科学研究中的应用 王德武等 2 人 19(1995)473
- 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
- 刘建峰 光子穿透系数及同质异能态俘获截面的研究 刘建峰等 2 人 20(1996)563
- 刘建业 在量子分子动力学模型中与 N, Z 有关的宏观势对碎片形成的影响 李君清等 4 人 18(1994)379
- 中能重离子碰撞动力学研究 刘建业等 2 人 19(1995)53
- 用改进的量子分子动力学研究中能重离子碰撞中多重碎裂 刘 航等 4 人 19(1995)1040
- 多重碎裂和相互作用势的涨落 李君清等 5 人 20(1996)332
- 对中能重离子碰撞碎片形成过程中核结构效应的研究 刘 航等 3 人 20(1996)723
- 在中能重离子反应中核子的运动特征 李君清等 4 人 20(1996)839
- 重离子碰撞两体关联输运理论 I. 理论模型: 相干态表象的构造与基本运动方程 刘建业等 5 人 20(1996)1007
- 重离子碰撞两体关联输运理论 II. 使用变分原理确定单粒子态的演化方程和反对称分子动力学 李希国等 3 人 21(1997)162
- 重离子碰撞两体关联输运理论 III. 半经典近似下的数值计算 刘 航等 5 人 21(1997)169
- 刘金明 独立元格试探作用量对 3 维 $SU(2)$ 格点规范理论相结构的变分研究 刘金明等 2 人 17(1993)128
- 刘经华 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 刘 靖 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073

- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 刘觉平 有限温度 QCD 求和规则与 ρ 介子 刘觉平等 2 人 19(1995)1108
 0^{++} 三胶子标胶球与 QCD 求和规则 陆文韬等 2 人 20(1996)691
- 刘力 1+1 维 $U(1)$ Higgs 模型 Non-contractable loop 和 Sphaleron 李玉晓等 3 人 18(1994)1003
- 刘联臻 利用加速器质谱计测量 ^{10}Be 形成截面 刘联臻等 6 人 19(1995)786
- 刘连寿 强子-强子碰撞中平均横动量随多重数变化的能量关联与三火球模型 蓝其开等 2 人 17(1993)934
 相对论重离子碰撞中的线性背景与非线性效应 庄鹏飞等 2 人 18(1994)143
 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能 pp 碰撞末态粒子的结团产生和前后关联 张阳等 2 人 18(1994)326
 自仿射分形在高能碰撞多重产生中的应用 吴元芳等 2 人 18(1994)433
 高能碰撞多粒子末态间歇现象与关联积分的研究 张阳等 5 人 18(1994)621
 α 模型的改进和 Levy 指数的解析计算 林海等 3 人 18(1994)858
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
 强子碰撞中平均横动量的多重数分布随截断的变化 蓝其开等 2 人 19(1995)826
 有限温度下无质量 ϕ^3 理论中角度红外发散的正规化 陈相君等 2 人 19(1995)907
 高能碰撞二维相空间自仿射分形的解析研究 林海等 3 人 20(1996)65
 高能多粒子产生反常标度性研究中的相空间变量选择 刘连寿等 2 人 20(1996)357
 HERA 硬光生过程中的光子产生 李云德等 2 人 20(1996)505
 HERA 分解光子过程中的双喷注产生 李云德等 2 人 20(1996)601
 二维相空间的自仿射分形一维投影的解析研究 林海等 2 人 20(1996)625
 随机级联模型的连续标度行为 张阳等 3 人 20(1996)715
 高能碰撞中动力学起伏的横动量守恒约束 张阳等 3 人 21(1997)130
 高能碰撞中喷注判定法的研究 刘明等 4 人 21(1997)138
 有限温度下无质量场真空图中红外发散的正规化 陈相君等 2 人 21(1997)425
 一维投影 α 模型的子波关联 林海等 2 人 21(1997)513
 核-核碰撞间歇现象的混合效应 胡源等 3 人 21(1997)604
 强子-强子碰撞中硬分量存在的又一实验证据 刘红平等 4 人 21(1997)609
- 刘良钢 ρ^0, ω 介子正负电子对衰变中的 ρ^0 - ω 混合效应 17(1993)614
 核物质中 π 介子引起的粒子-空穴和 Δ -空穴激发 刘良钢等 3 人 18(1994)1027
- 刘明 高能碰撞中喷注判定法的研究 刘明等 4 人 21(1997)138
- 刘念宗 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 刘庆军 π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王山等 8 人 17(1993)725
 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人 17(1993)912
 高能 p-A 碰撞中领头粒子快度分布的几何效应和碎裂效应 刘庆军等 2 人 19(1995)340
- 刘荣光 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289

- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 刘绍敏 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
 刘曙东 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈宇等 8 人 17(1993)673
 刘铁辉 北京谱仪亮度监测器 Bhabha 散射截面的蒙特卡罗计算 朱永生等 4 人 18(1994)503
 刘威 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
 刘慰仁 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 刘文勤 中能质子相对论光学势分析 冯大春等 3 人 17(1993)372
 电子准弹性散射宇称不守恒中的奇异夸克效应 刘文勤等 2 人 21(1997)937
 刘文生 有限温度阿贝尔格点规范理论相变的解析研究 刘文生等 4 人 18(1994)996
 刘希明 $e^{+}e^{-}$ 湮没中不同味道夸克喷注带电粒子多重数差别 18(1994)829
 高能 $e^{+}e^{-}$ 湮没末态 $\eta'-\eta$ 介子多重数比率 18(1994)1091
 非弹性和集团数在高能极限下的行为 王群等 5 人 19(1995)620
- 刘宪辉 N, Δ 重子谱计算中高组态混合效应的影响 程子韬等 3 人 20(1996)658
 双超核 ${}_{\Lambda\Lambda}^5\text{H}, {}_{\Lambda\Lambda}^5\text{He}, {}_{\Lambda\Lambda}^4\text{H}, {}_{\Lambda\Lambda}^4\text{He}$ 的研究 程子韬等 2 人 20(1996)736
- 刘祥安 ${}^{171}\text{Lu } 1/2^{-}[541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
 ${}^{162}\text{Lu}$ 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 ${}^{117}\text{Xe}$ 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
- 刘延 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 刘耀阳** 自对偶场与规范场相互作用理论的 Faddeev-Jackiw 量子化 缪炎刚等 2 人 18(1994)58
- 包含轻子结构的夸克模型 刘耀阳等 3 人 20(1996)900
- 刘业厚** 利用 $SU(2)_{q,s}$ 量子代数的两参数变形振子实现讨论 $SU(2)_{q,s}$ 相干态 于肇贤等 4 人 19(1995)258
- 双参数变形量子代数 $SU(1, 1)_{q,s}$ 的 Nodvik 实现和 Holstein-Primakoff 实现 于肇贤等 4 人 20(1996)1082
- 双参数变形多模玻色算符的代数结构及其应用(I) 于肇贤等 4 人 21(1997)999
- 刘亦铭** 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
- π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725
- 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人 17(1993)912
- 相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511
- π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630
- 多粒子玻色关联对夸克胶子等离子体颗粒源的检测 张卫宁等 6 人 19(1995)148
- 高能重离子碰撞中末态粒子的极角分布 霍 雷等 6 人 20(1996)311
- 多 π 关联对 π 发射源相干性的分析 张卫宁等 5 人 20(1996)707
- 高能重离子碰撞中末态粒子分布的非对称性 霍 雷等 5 人 20(1996)812
- 夸克的半经典输运方程 陈相君等 3 人 21(1997)905
- 刘 庸** 偶偶核高自旋态的微观研究(I)理论方案 桑建平 2 人 18(1994)936
- 偶偶核高自旋态的微观研究(II)对同中子异荷素 ^{154}Dy , ^{156}Er 和 ^{158}Yb 的应用 桑建平 2 人 18(1994)1020
- 偶偶核高自旋态的微观研究(III)对同位素 ^{126}Ba , ^{128}Ba 和 ^{130}Ba 的应用 桑建平 2 人 18(1994)1102
- 刘玉鑫** Xe 偶-偶同位素低激发态性质的 IBM2 描述 张大立等 3 人 18(1994)1130
- 刘运祚** 高自旋态下 ^{160}Lu 能级自旋的确定 孙慧斌等 6 人 19(1995)929
- ^{171}Lu $1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 刘占稳** ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 刘振安** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

- 刘 忠 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC / β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
奇 $A^{117-125}\text{Cs}$ 核 $\pi h_{11/2}$ 带的研究 邢 正等 5 人 20(1996)639
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 ^{171}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘 忠等 14 人 21(1997)881
HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 刘祖华 84.0 MeV ^{16}O 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
 $^{16}\text{O} + ^{\text{nat}}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
垒下 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 裂变碎片角关联模拟 钱 兴等 6 人 18(1994)385
 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
预平衡裂变 刘祖华等 6 人 20(1996)107
用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
 $^{19}\text{F} + ^{208}\text{Pb}$ 近垒及垒下准弹反应 林承键等 6 人 21(1997)872
- 刘 琦 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho \pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K \bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma \pi^0, \gamma \eta, \gamma \eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 刘 璇 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 刘 昕 $\phi 76\text{mm} \times 100\text{mm}$ BGO 闪烁探测器探测效率测量 刘 昕等 5 人 18(1994)496
- 刘 晔 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- 刘 炜 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 柳 峰 高能强子-强子碰撞中硬软过程的比较分析 柳 峰等 2 人 21(1997)330
高能碰撞中喷注判定法的研究 刘 明等 4 人 21(1997)138
- 龙君彦 q 变形带电 Fermion 相干态和 q' 变形的 $SU(3)$ 电荷、超荷 Fermion 相干态 郝三如等 3 人 18

- (1994)919
- 龙胜东 核激子态的瞬时概率分布和非平衡熵 潘忠诚等 4 人 17(1993)444
- 娄继忠 偶偶核 γ 不稳定集体激发的新公式 吴连坳等 2 人 19(1995)941
有效价核子对数的微观意义初探 吴连坳等 2 人 21(1997)257
- 卢大海 关联对的 fpc 21(1997)500
集体运动态中的辛弱数混合 21(1997)633
- 卢 红 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 卢 俊 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
耗散反应产物的电荷扩散与能量相干 卢 俊等 6 人 21(1997)825
- 卢 明 $^{56,57}\text{Fe}$, $^{59}\text{Co}(\alpha, d)$ 核反应及拉长态性质的实验研究 袁 坚等 5 人 20(1996)32
- 卢希庭 中能重离子碰撞中线动量耗散动力学 黄小临等 5 人 18(1994)154
 ϕ 76mm $\times$ 100mmBGO 闪烁探测器探测效率测量 刘 昕等 5 人 18(1994)496
- 卢 昭 格点定模 $SU(2)$ -Higgs 模型的解析计算 郑希特等 4 人 19(1995)137
- 卢兆启 中高能质子与核碰撞反应机制的研究 卢兆启等 2 人 18(1994)647
- 鲁公儒 Δr 的实验测量与唯象分析 肖振军等 3 人 17(1993)516
TC 理论中矢量介子衰变研究 岳崇兴等 2 人 17(1993)1002
BSW 方案中的模型相关性 罗传望等 5 人 18(1994)601
Technicolor 理论中的赝标格尔斯通粒子对 $t \rightarrow W^+ b$ 过程所产生的虚效应 王学雷等 5 人 18(1994)1086
 t 夸克圈对 TC 理论的中性 PG 玻色子反常耦合的影响 岳崇兴等 2 人 19(1995)131
一代 Technicolor 模型对稀有衰变 $t \rightarrow cV$ 的贡献 王学雷等 4 人 19(1995)534
探测中性 TC 矢量介子的可能性 岳崇兴等 3 人 19(1995)1096
C. D. Carone 模型中的 t 夸克稀有衰变 鲁公儒等 5 人 20(1996)414
PGBs 对高能 e^+e^- 湮没产生顶夸克对的单圈量子效应 鲁公儒等 3 人 20(1996)522
Z 衰变对 OGIM 与 MTC 模型的限制 王学雷等 3 人 20(1996)610
现实的一代 ETC 模型对 $Zb\bar{b}$, $Z\tau^+\tau^-$ 顶角的辐射修正 岳崇兴等 3 人 20(1996)997
PG 玻色子 P_a^0 在 Tevatron 上的可能物理迹象 岳崇兴等 2 人 21(1997)311
用 Technicolor 理论研究稀有辐射衰变 $B_c \rightarrow D_s^* \gamma$ 鲁公儒等 4 人 21(1997)413
TC 模型中 PGB 对 Tevatron 上 $t\bar{t}$ 产生截面的单圈修正 杨 华等 3 人 21(1997)591
Technicolor 模型下 QCD 对衰变 $B \rightarrow X\tau\nu_\tau$ 的修正 鲁公儒等 4 人 21(1997)897
 $b \rightarrow s\gamma$ 在 Multiscale Walking Technicolor 模型中的研究 鲁公儒等 4 人 21(1997)1005
- 鲁建业 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

- 路秀琴 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
- 鹿立新 84.0 MeV ^{16}O 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
 $^{19}\text{F} + ^{208}\text{Pb}$ 近垒及垒下准弹反应 林承键等 6 人 21(1997)872
- 陆昌国 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 陆道如 $^{56,57}\text{Fe}$, $^{59}\text{Co}(\alpha, d)$ 核反应及拉长态性质的实验研究 袁 坚等 5 人 20(1996)32
- 陆辉华 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 陆穗苓 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486
从高山乳胶室族事例研究强相互作用在碎裂区的特征 陈江川等 4 人 19(1995)494
超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116
- 陆伟达 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 陆文韬 0^{++} 三胶子标胶球与 QCD 求和规则 陆文韬等 2 人 20(1996)691
- 陆中道 带权重的分布及其间歇性 陆中道等 4 人 17(1993)949
几率分布指数率与间歇现象 张孝泽等 6 人 18(1994)160
再散射输运模型与 K^+/π^+ 比的系统学 王仲奇等 6 人 18(1994)567
相对论性核碰撞中 K^+/π^+ 增强的输运模型解释 王仲奇等 6 人 18(1994)741
AGS 能量下核系统的强阻止性 宋 光等 6 人 19(1995)172
重离子碰撞中产生的 K 介子末态作用 储自力等 4 人 19(1995)365
极端相对论性核碰撞中的奇异重子与 QGP 讯号 萨本豪等 3 人 19(1995)1019
重离子碰撞中 K 介子和 π 介子产生的统一动力学模拟 储自力等 5 人 20(1996)438
熔合碎裂模型和 ALADIN 多重碎裂数据 王 飞等 4 人 20(1996)644
玻色-爱因斯坦关联半径和源半径对实验窗口的依赖及它们的差异 陆中道等 4 人 21(1997)458
- 陆祖荫 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 吕 峰 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 吕继华 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 吕军光 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193

- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 吕俊 $^{16}\text{O} + ^{nat}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
 吕雨生 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
 在低能 e^+e^- 湮没中寻找低质量中性粒子 何景棠等 4 人 18(1994)404
- 罗传望 BSW 方案中的模型相关性 罗传望等 5 人 18(1994)601
 罗光宣 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线‘膝’区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
- 罗会英 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 罗棋 400GeV / c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
 400GeV / c pp 碰撞赝快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
- 罗清政 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
 42MeV / u ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
 46.7MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb , ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
 20MeV 到 180MeV / u $^{16}\text{O} + ^{197}\text{Au}$ 系统的 BUU 计算: 线动量与角动量转移依赖碰撞参数与能量研究 阎德宏等 5 人 18(1994)1035
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 135MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦芝等 11 人 19(1995)481
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
 中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
 热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
- 罗世彬 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 罗栓群 热核表面能的 Thomas-Fermi 统计模型理论 罗栓群等 2 人 19(1995)278
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89

- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 罗文芸 FeCl⁺ 轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
- 罗亦孝 ²⁰Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
¹¹⁷Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
 首次测定短寿命缺中子同位素¹⁵³Er 和¹⁵⁷Yb 的 EC/ β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 对质子滴线核¹⁹Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
 缺中子核¹⁹⁷Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
 氦喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068
¹⁷⁵Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
¹⁹⁸Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
 双奇核¹⁷⁰Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
¹¹⁷Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘 忠等 14 人 21(1997)881
 HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 罗永峰 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
 TR4 终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
 大动态范围双维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
 RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
- 罗 勇 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 罗紫华 BPL-RFQ 加速器束流动力学设计研究 罗紫华等 2 人 19(1995)658
- 罗 焱 共形变换与自对偶场的辛结构 杨孔庆等 2 人 20(1996)789

M

- 马爱民 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97

- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 北京 τ -c工厂(BTCF)快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 马伯强 非微扰夸克传播子与核子结构函数的非平庸 Q^2 依赖性研究 杨建军等 3 人 21(1997)146
- 马东红 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 马恩成 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 马凤才 有限密度下的核子有效质量和 EMC 效应的一种可能解释 马凤才等 3 人 19(1996)651
- 马惠芳 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 马基茂 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- e/π 识别的 dE/dx 方法在北京谱仪 τ 重轻子质量测量中的应用 荣 刚等 6 人 17(1993)865
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
 关于 $\tau/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 马瑞昌 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
 ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
 新核素 ^{65}Se 半衰期的首次实验测定 黄文学等 4 人 20(1996)113
 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
 对 ^{69}Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(EC + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)289
 合成和研究滴线区新核素 β 延迟质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 马受武 低能电子径迹中能量沉积频率分布 李强等 3 人 19(1995)1078
 液态水中重离子径向剂量分布的计算 李强等 3 人 20(1996)476
- 马涛 $4+2D$ 维 Einstein-Maxwell 量子宇宙 倪致祥等 2 人 18(1994)911
- 马桃桃 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 马维兴 核物质中 π 介子引起的粒子-空穴和 Δ -空穴激发 刘良钢等 3 人 18(1994)1027
 质子的自旋危机问题 马维兴等 2 人 21(1997)362
 核子中夸克的极化 21(1997)946
- 马英君 高自旋态下 ^{160}Lu 能级自旋的确定 孙慧斌等 6 人 19(1995)929
 $^{171}\text{Lu} 1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 马余刚 中能区 $^{86}\text{Kr} + ^{197}\text{Au}$ 反应中的能量耗散、 π 介子阈下产生和流角 马余刚等 4 人 17(1993)186
 一个在 SPEG 磁谱仪上鉴别中能重离子反应中中重产物的分析方法 冯军等 6 人 17(1993)769
 中子分布弥散度对反应总截面的影响 冯军等 3 人 18(1994)97
 $10.6\text{MeV}/u \ ^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶巍等 12 人 21(1997)1
 用动力学模型计算 $10.6\text{MeV}/u \ ^{84}\text{Kr}(^{27}\text{Al}, \text{准裂变})$ 反应的裂变时间 叶巍等 6 人 21(1997)348
- 马占卿 Fermi-Dirac 关联与 $Q^{-\nu}K_\nu(Q)$ 分布 戴启润等 4 人 20(1996)1014
- 马中玉 中能质子相对论光学势分析 冯大春等 3 人 17(1993)372
 中能电子-核准弹性散射响应函数 17(1993)1107
 相对论平均场方法研究远离 β 稳定线核的性质 陈宝秋等 2 人 18(1994)371
 N-N 关联和有限核相对论平均场方法 陈宝秋等 3 人 19(1995)852
 电子准弹性散射宇称不守恒中的奇异夸克效应 刘文勤等 2 人 21(1997)937
- 马中骥 $L^\pm$ 算符和量子包络代数 谢汨等 3 人 20(1996)617
- 茅广军 相对论重离子反应的热化过程 李祝霞等 4 人 18(1994)559
 核内核子-核子非弹散射截面(I) 茅广军等 4 人 19(1995)540
 核内核子-核子非弹散射截面(II) 茅广军等 4 人 19(1995)628
 Δ 粒子的相对论 BUU 方程 茅广军等 3 人 20(1996)826

- 核内核子与 Δ 粒子的散射截面 茅广军等 3 人 20(1996)925
- 核内 Δ 吸收截面 茅广军等 4 人 20(1996)1053
- 毛成生 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
- 毛慧顺 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- e/π 识别的 dE/dx 方法在北京谱仪 τ 重轻子质量测量中的应用 荣刚等 6 人 17(1993)865
- 闪烁体瓦片/光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 毛裕芳 硅微条探测器的研制 毛裕芳等 3 人 17(1993)784
- 硅光电二极管作为 CsI(Tl)晶体读出元件的实验研究 何景棠等 5 人 20(1996)890
- CsI(Tl)晶体的辐照损伤研究 何景棠等 5 人 21(1997)21
- 毛泽普 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 北京谱仪主漂移室的径迹重建 毛泽普等 5 人 17(1993)193
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385

- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 雷亚军 对电子中微子质量为虚数的质疑 庆承瑞等 6 人 19(1995)27
- 梅东明 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10TeV 能区的γ射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 孟伯年 用高纯锗γ-谱仪借助滑动比较方法精密测量放射性核的γ-射线能量 张天保等 5 人 17(1993)202
- 仲态电子偶素湮没辐射能量的改进测量 彭良强等 5 人 19(1995)987
- 孟杰 转动核对转移矩阵元与 Berry 相位 孟杰等 3 人 18(1994)249
- 孟烈 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10TeV 能区的γ射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 孟庆华 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
- 孟宪茹 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10TeV 能区的γ射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 孟祥承 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S)的τ轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由ψ(2S)→π⁺π⁻J/ψ道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- ψ(2S)→ρπ及ψ(2S)→K $\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S)强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ→γπ⁰、γη、γη'→3γ衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 米玛次仁 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 缪建伟 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
- 缪炎刚 Schwinger 模型的玻色化形式的 BFV 量子化 17(1993)407
- 线性自对偶约束理论的一种推广形式及其量子化 17(1993)626
- 自对偶场与规范场相互作用理论的 Faddeev-Jackiw 量子化 缪炎刚等 2 人 18(1994)58
- 闵德芬 K⁺核散射与非线性密度相关修正 闵德芬等 6 人 17(1993)462
- 莫文玲 核子的组分夸克模型与 O + U→μ $\bar{\mu}$ + X 过程 莫文玲等 4 人 18(1994)282
- 牟万统 47MeV/u ¹²C 同 ¹³³Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873

- 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
 ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
 ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 木 钧** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 银河宇宙线核传播的蒙特卡罗模拟 张 力等 4 人 17(1993)589
 太阳耀斑与太阳高能粒子 张 力等 3 人 20(1996)877
 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865

N

- 倪光炯** Berry 联络与吴-杨单极势 沈月林等 2 人 19(1995)500
倪致祥 $4 + 2D$ 维 Einstein-Maxwell 量子宇宙 倪致祥等 2 人 18(1994)911
倪蕙苓 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 用小角度 Bhabha 事例谱形分析方法确定北京谱仪亮度 朱启明等 4 人 17(1993)1057
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 聂 晶** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 宁平治 一个简单的 K^+N 二体势 宁平治等 3 人 17(1993)152
 K^+ 核散射与非线性密度相关修正 闵德芬等 6 人 17(1993)462
 牛红权 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
 牛世文 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
 努桑 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385

O

- 区秀兰 ALICE 程序在重离子反应中的应用 袁双贵等 4 人 17(1993)1065

P

- 潘峰 Brauer 代数不可约表示的基矢构造及维数公式 19(1995)734
 q 形变壳模型中奇 A 核的磁矩 潘峰等 2 人 20(1996)538
 潘巨祥 同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
 潘玲君 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 潘强岩 用单能 γ 射线源校刻 β 塑料闪烁体能谱仪 潘强岩等 4 人 17(1993)391
 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
 实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 ALICE 程序在重离子反应中的应用 袁双贵等 4 人 17(1993)1065
 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
 潘卫民 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 潘忠诚 核激发态的瞬时概率分布和非平衡熵 潘忠诚等 4 人 17(1993)444
 不同激发能的 ^{208}Pb 核的非平衡态的概率分布与熵 潘忠诚等 3 人 19(1995)757
 彭宏安 核子的组分夸克模型与 $O + U \rightarrow \mu\bar{\mu} + X$ 过程 莫文玲等 4 人 18(1994)282
 高能 $p + p(\bar{p})$ 碰撞中 J/ψ 和 Υ 的硬衍射产生 彭宏安等 3 人 18(1994)1078
 高能 $p + p(\bar{p})$ 碰撞中双重 Pomeron 交换和 $J/\psi, \Upsilon$ 产生过程 彭宏安等 3 人 19(1995)34
 关于 $\mathbb{P}$ 的结构模型(部分子分布)的检验 何祯民等 4 人 19(1995)310
 改进的 Q^2 -重标度模型与部分子分布函数的核效应 姚晓霞等 5 人 21(1997)548
 彭良强 仲态电子偶素湮没辐射能量的改进测量 彭良强等 5 人 19(1995)987
 氟化铍团簇基纳米相薄膜的慢正电子研究 巨新等 5 人 21(1997)844
 平加伦 夸克激发与质子自旋 沈洪清等 6 人 18(1994)277

Q

- 漆纳丁 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
ψ(2S) 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
ψ(2S) → ρπ 及 ψ(2S) → K $\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
ψ(2S) 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γγ、γγ' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
北京τ-c工厂(BTCF)快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 漆玉金 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
46.7MeV/A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
20MeV 到 180MeV/u $^{16}\text{O} + ^{197}\text{Au}$ 系统的 BUU 计算: 线动量与角动量转移依赖碰撞参数与能量研究 阎德宏等 5 人 18(1994)1035
25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV/u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
- 齐利杰 夸克势模型中的重子-重子相互作用自旋-轨道耦合势 齐利杰等 4 人 18(1994)757
N-N 相互作用中自旋轨道耦合力的夸克模型 张建华等 5 人 19(1995)87
- 祁 中 RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 钱诚德 转动区偶偶核正宇称态的八极关联效应 18(1994)473
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 钱 青 反质子与电子偶素碰撞而形成反氢原子的探讨 程子韬等 4 人 17(1993)448
- 钱 涛 25MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
- 钱铁铮 CP¹ 模型的拓扑项的可移性与 θ 真空 高孝纯等 2 人 18(1994)137
- 钱 兴 84.0MeV ^{16}O 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680

- 垒下 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 裂变碎片角关联模拟 钱 兴等 6 人 18(1994)385
 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
 垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
 近垒及垒下 $^{12}\text{C} + ^{93}\text{Nb}$ 的蒸发剩余核截面 钱 兴等 5 人 19(1995)603
 预平衡裂变 刘祖华等 6 人 20(1996)107
 $25\text{MeV} / \text{u} \ ^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
 用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
 $25\text{MeV} / \text{u} \ \text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}, ^{209}\text{Bi}$ 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 钱志新 有限温度和有限密度下的汤川势 钱志新等 3 人 17(1993)417
- 钱琬燕 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 乔际民 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 譙 愚 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
 垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
 预平衡裂变 刘祖华等 6 人 20(1996)107
- 秦克诚 高能 $p + p(\bar{p})$ 碰撞中 J/ψ 和 Υ 的硬衍射产生 彭宏安等 3 人 18(1994)1078
 高能 $p + p(\bar{p})$ 碰撞中双重 Pomeron 交换和 J/ψ , Υ 产生过程 彭宏安等 3 人 19(1995)34
 关于 $\mathbb{P}$ 的结构模型(部分子分布)的检验 何祯民等 4 人 19(1995)310
- 秦 庆 北京正负电子对撞机束团拉伸效应研究 国智元等 3 人 20(1996)1034
- 秦玉明 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 秦 芝 $47\text{MeV} / \text{u} \ ^{12}\text{C}$ 同 ^{133}Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
 ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
 $600\text{MeV} \ ^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
 $135\text{MeV} / \text{u} \ ^{12}\text{C}$ 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦 芝等 11 人 19(1995)481
 $6.3\text{--}24.6\text{MeV} / \text{u} \ ^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张 翔等 9 人 20(1996)21
 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
 元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张 立等 8 人 21(1997)891
- 覃克宇 描述高能强相互作用的荷电粒子多重性分布 18(1994)347
 $\sqrt{S} = 1800\text{GeV} \ \bar{p}p$ 碰撞荷电粒子多重性分布的计算 20(1996)635
 初态相互作用与高能 $p\text{--}A$ 碰撞中 J/ψ 产额的压低 覃克宇等 3 人 20(1996)1003
- 庆承瑞 对电子中微子质量为虚数的质疑 庆承瑞等 6 人 19(1995)27
- 邱进发 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 BES实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 邱 荣 阿贝尔手征群陪集纯规范场的恒等式和重整化 17(1993)227
- 邱锡钧 用手征夸克孤子模型计算 Λ 的性质 许晓明等 2 人 17(1993)65

- 一个膨胀的热核物质的双轻子谱 贺泽君等 3 人 17(1993)731
- 强子的内部激发和 QCD 真空在核物质的热力学行为上的效应 贺泽君等 4 人 17(1993)1126
- 膨胀的热的富重子夸克-胶子物质的双轻子产生的抑制 贺泽君等 3 人 19(1995)165
- 中心快度区的双轻子不变质量分布 贺泽君等 3 人 19(1995)1036
- 裘志洪 中子与 α 相互作用的两体等效可分离势 裘志洪等 5 人 17(1993)845
- 裘忠平 $(2+1)$ 维 $SU(2)$ 四费米子耦合理论的 Ward-Takahashi 恒等式和质量谱 沈 坤等 2 人 17(1993)17
- 在 $(2+1)$ 维手征 Gross-Neveu 模型中有限温度的 Ward-Takahashi 恒等式和手征相变 沈 坤等 2 人 17(1993)208
- $(2+1)$ 维手征 Gross-Neveu 模型的顶角修正和相结构 沈 坤等 2 人 17(1993)811
- 在 $(2+1)$ 维手征 Gross-Neveu 模型中有限温度的顶角修正和退耦合相变 沈 坤等 2 人 17(1993)933
- 屈云河 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 全明秀 Ar 离子辐照非晶态合金表面发泡和针孔形成研究 刘昌龙等 4 人 20(1996)763
- 阙建中 关于 sd IBM 中自洽 Q 框架的高阶效应 王保林等 3 人 17(1993)1048
- 三玻色子核的核谱研究 张庆营等 4 人 18(1994)353
- 阙友昆 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- R**
- 饶亦农 HIRFL-CSR 电子冷却装置上的横向电子束温度 饶亦农等 4 人 20(1996)369
- 重离子的束内散射 饶亦农等 4 人 20(1996)430
- 储存环内电子冷却过程模拟 饶亦农等 4 人 21(1997)368
- 任国孝 200A GeV ^{32}S 与 Cu 作用产生的重碎片的角分布 荆贵茹等 2 人 17(1993)976
- 任江龙 高能强子与原子核碰撞的受伤核子数分布和非弹性截面的计算 任江龙等 2 人 20(1996)119
- 任敬儒 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486

- 超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
 大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116
 用神经网络分辨原初宇宙线成份 梁化楼等 5 人 21(1997)205
 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
 任廉重 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 任学藻 有限温度格点 $U(1)$ 规范理论计算 郑希特等 2 人 17(1993)134
 任中洲 晕核 ^{11}Li , ^{14}Be 和 ^{17}B 的进一步研究 任中洲等 2 人 19(1995)562
 ^{100}Sn 核基态性质的微观研究 任中洲等 2 人 19(1995)1029
 对奇异核的 Skyrme-Hartree-Fock 计算 沈姚崧等 2 人 21(1997)248
 对 Δ 超核的相对论平均场计算 沈姚崧等 2 人 21(1997)831
 荣 刚 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 e/π 识别的 dE/dx 方法在北京谱仪 τ 轻子质量测量中的应用 荣 刚等 6 人 17(1993)865
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣 刚等 13 人 20(1996)577
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 阮 东 $N = 4$ 超对称量子力学 黄惟承等 2 人 19(1995)812
 阮 明 $^{16}\text{O} + ^{nat}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
 阮景辉 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
 阮文英 对称性对三体系统结构的影响 阮文英等 2 人 18(1994)74
 对称性对四体系统结构和内部运动的影响 阮文英等 2 人 18(1994)454
 用 α 粒子模型描写 800MeV 的 $p-^{40}\text{Ca}$ 散射 阮文英等 2 人 19(1995)264

S

- 萨本豪 带权重的分布及其间歇性 陆中道等 4 人 17(1993)949
 几率分布指数率与间歇现象 张孝泽等 6 人 18(1994)160
 再散射输运模型与 K^+/π^+ 比的系统学 王仲奇等 6 人 18(1994)567
 相对论性核碰撞中 K^+/π^+ 增强的输运模型解释 王仲奇等 6 人 18(1994)741
 AGS 能量下核系统的强阻止性 宋 光等 6 人 19(1995)172

- 重离子碰撞中产生的 K 介子末态作用 储自力等 4 人 19(1995)365
- 极端相对论性核碰撞中的奇异重子与 QGP 讯号 萨本豪等 3 人 19(1995)1019
- AGS 能量下 $\pi^+ \pi^-$ 的 Bose-Einstein 关联 冯中汉等 3 人 20(1996)142
- 重离子碰撞中 K 介子和 π 介子产生的统一动力学模拟 储自力等 5 人 20(1996)438
- 熔合碎裂模型和 ALADIN 多重碎裂数据 王 飞等 4 人 20(1996)644
- 弹剩余核衰变模式间竞争及其在 ALADIN 数据中的呈现 王 飞等 4 人 20(1996)729
- 非完全熔合碎裂模型与核液气相变 王 辉等 4 人 21(1997)44
- 200A GeVpp, pS 和 SS 碰撞中单奇异性粒子产生数据的分析 萨本豪等 3 人 21(1997)720
- 桑建平 偶偶核高自旋态的微观研究(I)理论方案 桑建平等 2 人 18(1994)936
- 偶偶核高自旋态的微观研究(II)对同中子异荷素¹⁵⁴Dy、¹⁵⁶Er 和¹⁵⁸Yb 的应用 桑建平等 2 人 18(1994)1020
- 偶偶核高自旋态的微观研究(III)对同位素¹²⁶Ba、¹²⁸Ba 和¹³⁰Ba 的应用 桑建平等 2 人 18(1994)1102
- 沙 健 金属玻璃 Pd_{79.5}Ni₄Si_{16.5} 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
- 尚仁成 氮喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068
- BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
- 邵贝贝 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈 宇等 8 人 17(1993)673
- 国家同步辐射实验室周围辐射场特点及相应监测方法 李裕熊等 3 人 21(1997)81
- 邵 彬 含 G 对费米子动力学对称 SP(10)模型的 Dyson 玻色子实现 18(1994)27
- 费米子动力学对称群的玻色子实现 18(1994)541
- 考虑三体相互作用项的 O(6) 能谱修正公式 18(1994)1124
- 邵建军 Cd 偶同位素集体能谱与价质子空穴激发特性 18(1994)943
- 邵景鸿 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
- 邵毓莺 J/ψ 强衰变中 f₂(1270) 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 f₀(975) 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S) 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 ψ(2S) → π⁺π⁻J/ψ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- ψ(2S) → ρπ 及 ψ(2S) → K $\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 i/η(1440) 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S) 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- τ[±] → π[±] + nπ⁰ + ν_τ (n = 0, 1, 2) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γη、γη' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 申 虹 垒下熔合反应的一种 α 粒子转移的解释 申 虹等 2 人 17(1993)161
- 申庆彪 温度相关的核子相对论微观光学势 韩银录等 3 人 17(1993)568
- E ≤ 50 MeV 能区核反应机制的研究 17(1993)739
- 核反应中的核结构效应 张竞上等 4 人 17(1993)745
- 四级交换图对相对论微观光学势的贡献 韩银录等 4 人 17(1993)751

- 沈本蔚** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 沈彩万** 奇 A Tm 同位素链及 $[411\ 1/2]$ 带退耦参数性质的研究 董宝国等 3 人 21(1997)838
- 沈翠华** 对称裂变中惯性张量的计算 张学谦等 5 人 21(1997)58
- 沈定力** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^\mp \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 沈定中** 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
- 沈红** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^\mp \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385

- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 沈洪清 夸克激发与质子自旋 沈洪清等 6 人 18(1994)277
改进的部分子演化模型及其对 EMC 效应和核 Drell-Yan 过程的解释 于明俭等 5 人 18(1994)1107
- 沈建平 小 x 区域部分子演化模型的改进 于明俭等 3 人 17(1993)861
夸克激发与质子自旋 沈洪清等 6 人 18(1994)277
改进的部分子演化模型及其对 EMC 效应和核 Drell-Yan 过程的解释 于明俭等 5 人 18(1994)1107
- 沈 经 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 沈 坤 $(2+1)$ 维 $SU(2)$ 四费米子耦合理论的 Ward-Takahashi 恒等式和质量谱 沈 坤等 2 人 17(1993)17
在 $(2+1)$ 维手征 Gross-Neveu 模型中有限温度的 Ward-Takahashi 恒等式和手征相变 沈 坤等 2 人 17(1993)208
 $(2+1)$ 维手征 Gross-Neveu 模型的顶角修正和相结构 沈 坤等 2 人 17(1993)811
在 $(2+1)$ 维手征 Gross-Neveu 模型中有限温度的顶角修正和退耦合相变 沈 坤等 2 人 17(1993)933
- 沈彭年 色屏蔽效应与核子-核子相互作用 沈肖雁等 4 人 17(1993)816
用夸克集团模型推导的 $S = -1$ 的 NY 系统的等效定域势 沈彭年等 4 人 17(1993)941
 $b\bar{b}$ 体系中的色屏蔽效应 董宇兵等 4 人 18(1994)547
N-N 相互作用中自旋轨道耦合力的夸克模型 张建华等 5 人 19(1995)87
夸克-夸克等效相互作用与手征对称性 余友文等 4 人 19(1995)431
- 沈齐兴 用推广的矩分析方法确定过程 $J/\psi \rightarrow V_1 + X$, $X \rightarrow V_2 + V_3$ 中粒子 X 的自旋-宇称 沈齐兴等 2 人 17(1993)503
 J/ψ 强衰变产生的 $\theta(1720)$ 宽共振峰的研究 郁 宏等 5 人 17(1993)601
矩分析法与 $\xi(2220)$ 郁 宏等 2 人 17(1993)892
 $J/\psi \rightarrow V_1 + X$, $X \rightarrow \gamma + V_2$ 中玻色共振态 X 的自旋和宇称的确定 沈齐兴等 2 人 17(1993)988
 $e^+ + e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow V + X$, $X \rightarrow 3P$ 过程的角分布螺旋度形式 张吉龙等 3 人 18(1994)43
 $e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-$, $\tau^- \rightarrow a_1^- \nu_\tau$, $a_1^- \rightarrow \rho\pi$ 过程的角分布和 a_1 介子的性质 郁 宏等 3 人 18(1994)583
一个可能的共振态—— $J/\psi \rightarrow X + f_0(975)$ 过程中玻色共振态 X 的自旋-宇称分析 郁 宏等 2 人 18(1994)1143
 J/ψ 三级二体衰变过程中产生的玻色共振态的研究 沈齐兴等 3 人 19(1995)16
过程 $e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow V + X(J^{PC})$, $X \rightarrow 3P$ 的矩分析 张 霖等 3 人 19(1995)800
用推广的矩分析方法确定 $J/\psi \rightarrow X + f_0(980)$ 中玻色共振态 X 的自旋-宇称 沈齐兴等 2 人 20(1996)45
对过程 $e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow \gamma + X(J^{PC})$, $X \rightarrow BB$ (重子, 反重子) 的角分布和共振态 X 的自旋-宇称分析 张 霖等 3 人 20(1996)280
强子衰变过程 $J/\psi \rightarrow \omega\pi^+\pi^-$ 中的多道耦合 郁 宏等 2 人 21(1997)123
 J/ψ 衰变过程的矩分析和两种坐标系的比较 沈齐兴等 3 人 21(1997)408
- 沈水法 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
 ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 沈天光 $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞横快度分布涨落的分形分析 王韶舜等 6 人 19(1995)968

- 400GeV / c pp 碰撞产生粒子的方位角结构 王韶舜等 6 人 20(1996)297
- 沈文庆 中能区 $^{86}\text{Kr} + ^{197}\text{Au}$ 反应中的能量耗散、 π 介子阈下产生和流角 马余刚等 4 人 17(1993)186
一个在 SPEG 磁谱仪上鉴别中能重离子反应中中重产物的分析方法 冯 军等 6 人 17(1993)769
中子分布弥散度对反应总截面的影响 冯 军等 3 人 18(1994)97
10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶 巍等 12 人 21(1997)1
用动力学模型计算 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr}(^{27}\text{Al}, \text{准裂变})$ 反应的裂变时间 叶 巍等 6 人 21(1997)348
中心集体流对带电粒子关联函数的影响 郝鸿飞等 4 人 21(1997)627
100MeV / u Au + Au 对心碰撞中心集体流的发展 郝鸿飞等 5 人 21(1997)728
- 沈肖雁 色屏蔽效应与核子-核子相互作用 沈肖雁等 4 人 17(1993)816
用夸克集团模型推导的 $S = -1$ 的 NY 系统的等效定域势 沈彭年等 4 人 17(1993)941
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 沈姚崧 对奇异核的 Skyrme-Hartree-Fock 计算 沈姚崧等 2 人 21(1997)248
对 Λ 超核的相对论平均场计算 沈姚崧等 2 人 21(1997)831
- 沈有根 具有旋量场的量子虫洞 王文福等 3 人 18(1994)52
- 沈月林 Berry 联络与吴-杨单极势 沈月林等 2 人 19(1995)500
- 沈志功 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 沈智奇 用高纯锗 γ -谱仪借助滑动比较方法精密测量放射性核的 γ -射线能量 张天保等 5 人 17(1993)202
- 生文君 同步辐射小角散射实验站 董宝中等 4 人 19(1995)284
- 盛华义 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 关于 $\psi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau}$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 盛俊鹏 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 施朝淑 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
- 施兆民 入射能量为 5.1 MeV 中子 $^{58}\text{Ni}(n, \alpha)^{55}\text{Fe}$ 反应截面和出射粒子角分布测量 唐国等有 6 人 19(1995)223
- 施志政 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10 TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10 TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 石才士 混合型插入件的三维场形分析和计算 王培玮等 3 人 20(1996)468
- 石康杰 Z_n 格点模型的量子仿射变形代数 石康杰等 4 人 19(1995)229
- $SU(2)$ Thirring 模型边界算子的 Boson 表达式 王延申等 5 人 20(1996)216
- Z_n Belavin 模型的反射矩阵 陈 敏等 3 人 20(1996)794
- 用玻色化顶点算子实现与 Z_n 对称的 Belavin R 矩阵相关的 Z -F 代数 石康杰等 4 人 21(1997)706
- 石立军 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 石双惠 实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
- 石宗仁 铜系核的电偶极矩 石宗仁等 2 人 19(1995)185
- 铜系核集体运动的负宇称态 石宗仁等 2 人 19(1995)438
- 时万钟 $1+1$ 维 $U(1)$ Higgs 模型 Non-contractable loop 和 Sphaleron 李玉晓等 3 人 18(1994)1003
- 史 策 10 TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 史华林 $N-N$ 关联和有限核相对论平均场方法 陈宝秋等 3 人 19(1995)852
- 史焕章 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\psi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau}$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 司宗国 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}g$ 及 $\Upsilon \rightarrow 3g$ 碎裂的色弦结构 田丽丽等 3 人 17(1993)717
- 宋昌亮 ^{82}Se 的 $2\nu\beta\beta$ 衰变寿命和壳模型波函数 吴慧芳等 2 人 18(1994)366
- 宋光 再散射输运模型与 K^+/π^+ 比的系统学 王仲奇等 6 人 18(1994)567
- 相对论性核碰撞中 K^+/π^+ 增强的输运模型解释 王仲奇等 6 人 18(1994)741
- AGS 能量下核系统的强阻止性 宋光等 6 人 19(1995)172
- 宋桂莲 $p^3\text{He}$ 弹性散射动量空间库仑作用的研究 宋桂莲等 4 人 17(1993)763
- $p^3\text{He}$ 弹性散射动量空间库仑作用的处理 杨景奎等 2 人 20(1996)7350
- 宋宏秋 关于 β 稳定线公式的一个评注 林福民等 3 人 18(1994)745
- 核介质中核子-核子散射截面的 BHF 微观计算 蔡延璜等 3 人 20(1996)945
- 宋进虎 激光驱动光阴极高亮度电子束源以及新型光阴极的研究 耿荣礼等 3 人 21(1997)67
- 宋明涛 $25\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱兴等 15 人 20(1996)304
- $25\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{209}\text{Bi}$ 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 宋晓非 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 苏登贵 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 苏弘 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
- 苏憬 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 苏君辰 $u\bar{u} \rightarrow s\bar{s}$ 过程的胶子交换势与 $p\bar{p} \rightarrow \Lambda\bar{\Lambda}$ 过程的反应截面 杨易等 4 人 18(1994)85
- 苏汝铿 有限温度和有限密度下的汤川势 钱志新等 3 人 17(1993)417
- 有限温度下赝标耦合中的 η 介子 高守恩等 4 人 18(1994)148
- 有限温度单 ρ 介子交换势 郑国桐等 2 人 18(1994)525
- 关于 β 稳定线公式的一个评注 林福民等 3 人 18(1994)745
- 有限密度下的核子有效质量和 EMC 效应的一种可能解释 马凤才等 3 人 20(1996)651
- 苏实 族事例多心结构现象分析 范晓岭等 8 人 17(1993)486
- 苏淑芳 相对论核-核碰撞中产生的 Λ 粒子的横向极化度与横向动量的关联 叶云秀等 5 人 20(1996)685
- 苏有武 Moyer 模式在能重离子加速器辐射防护屏蔽设计中的应用 朱连芳等 4 人 20(1996)858

- 苏宗涤 光子穿透系数及同质异能态俘获截面的研究 刘建峰等 2 人 20(1996)563
- 孙长勇 双参数形变谐振子湮没算符高次幂的本征态 王继锁等 3 人 20(1996)703
双参数形变谐振子湮没算符高次幂本征态的量子统计性质 王继锁等 3 人 21(1997)793
- 孙 舫 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 孙国燕 利用加速器质谱计测量 ^{10}Be 形成截面 刘联瑞等 6 人 19(1995)786
- 孙汉城 高能轻子-核碰撞中簇射粒子的研究 刘福虎等 2 人 18(1994)208
相对论性重离子碰撞中负粒子的横动量和赝快度分布 刘福虎等 2 人 18(1994)1073
对电子中微子质量为虚数的质疑 庆承瑞等 6 人 19(1995)27
- 孙汉生 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
核探测器中混合气配制新方法 王运永等 6 人 18(1994)1
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 孙洪洲 $U(N) \supset SP(N) \supset O(3)$ 的分支律 王稼军等 2 人 18(1994)269
- 孙慧斌 高自旋态下 ^{160}Lu 能级自旋的确定 孙慧斌等 6 人 19(1995)929
 $^{171}\text{Lu} 1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- 孙剑辉 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
- 孙 建 混合型插件件的三维场形分析和计算 王培玮等 3 人 20(1996)468

- 孙可煦 北京同步辐射装置软 X 光束线通量谱的绝对测量与计算 崔明启等 6 人 20(1996)847
- 孙洛瑞 郑州 EAS 观测阵列的设计和初期运行 孙洛瑞等 4 人 17(1993)595
- 孙仁英 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 孙儒林 47MeV / u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
42MeV / u ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
- 孙式军 Al / GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
 D_5 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
关于 $\chi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 孙太怡 $p^3\text{He}$ 弹性散射动量空间库仑作用的研究 宋桂莲等 4 人 17(1993)763
- 孙同年 掺硫和在不同温度下 InP 的正电子湮没研究 黄懋容等 6 人 20(1996)1097
- 孙彤玉 42MeV / u ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
 $^{16}\text{O} + ^{115}\text{In}$ 反应的全熔合与非完全熔合 李文新等 5 人 18(1994)481
600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
135MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦芝等 11 人 19(1995)481
40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
6.3—24.6MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{186}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张翔等 9 人 20(1996)21
- 孙文起 C. D. Carone 模型中的 t 夸克稀有衰变 鲁公儒等 5 人 20(1996)414
- 孙文声 Ar 离子辐照非晶态合金表面发泡和针孔形成研究 刘昌龙等 4 人 20(1996)763
- 孙相富 ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
奇 A $^{117-125}\text{Cs}$ 核 $\pi h_{11/2}$ 带的研究 邢正等 5 人 20(1996)639
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 ^{162}Lu 的高自旋态及 A = 160 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 孙欣新 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 孙秀泉 核反应中的核结构效应 张竞上等 4 人 17(1993)745

- 孙秀荣 47MeV / u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
 ^{208}Hg 鉴别 张立等 12 人 18(1994)296
 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
 孙友梅 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
 孙岳 应用 MORSE 程序计算中子的天空反散射 吴靖民等 2 人 19(1995)377
 孙祖训 $^{56,57}\text{Fe}$, $^{59}\text{Co}(\alpha, d)$ 核反应及拉长态性质的实验研究 袁坚等 5 人 20(1996)32

T

- 台安 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 极端相对论性核碰撞中的奇异重子与 QGP 讯号 萨本豪等 3 人 19(1995)1019
 200A GeV pp, pS 和 SS 碰撞中单奇异粒子产生数据的分析 萨本豪等 3 人 21(1997)720
 谭继廉 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱兴等 15 人 20(1996)304
 用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$, ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
 谭有恒 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线‘膝’区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
 谈益平 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 汤平 极端相对论性重离子碰撞横能分布的 Glauber 理论 王正行等 3 人 20(1996)234
 汤月里 北京正负电子对撞机本底辐射及高 Z 闪烁体辐照损伤研究 陈宇等 8 人 17(1993)673
 唐传祥 热阴极微波电子枪模拟计算 唐传祥等 3 人 20(1996)376
 用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378
 多腔热阴极微波电子枪的实验研究 唐传祥等 6 人 21(1997)470
 唐鄂生 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82

- 北京同步辐射装置软 X 光束线通量谱的绝对测量与计算 崔明启等 6 人 20(1996)847
- 唐国有** 入射能量为 5.1 MeV 中子 $^{58}\text{Ni}(n, \alpha)^{55}\text{Fe}$ 反应截面和出射粒子角分布测量 唐国有等 6 人 19(1995)223
- 唐素秋** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S) 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S) 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γη、γη' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 唐孝威** 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
- 相对论性核-核碰撞中的弹核碎片多重数与角分布 刘福虎等 2 人 18(1994)334
- L3 中心径迹室顶点位置分辨的改进 杨长根等 5 人 18(1994)687
- L3 实验测量 τ 寿命的拟合方法及其误差讨论 杨长根等 5 人 18(1994)794
- 陶必友** 两维引力中的一种可积模型 颜 骏等 3 人 17(1993)322
- Baby 宇宙中的非阿贝尔蛙洞解 颜 骏等 3 人 17(1993)605
- 陶才德** 具有旋量场的量子虫洞 王文福等 3 人 18(1994)52
- 滕爱萍** 双参数形变谐振子湮没算符高次幂本征态的量子统计性质 王继锁等 3 人 21(1997)793
- 滕克俭** 用于微波电子枪注入器的 α 磁铁的设计和制造 黄永章等 3 人 17(1993)790
- 田家棋** 实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
- 田建玲** 北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γη、γη' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 田丽丽** $e^+e^- \rightarrow qqg$ 及 $\gamma \rightarrow 3g$ 碎裂的色弦结构 田丽丽等 3 人 17(1993)717
- Υ 的三胶子碎裂 田丽丽等 2 人 17(1993)885
- 田瑞生** 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 田卫华** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 田玉莲** BSRF 白光动态形貌实验系统 王功利等 5 人 21(1997)763
- 童德春** 用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378
- 童国梁** 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
- 确定 $\tau^+ \tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变道事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S) 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072

- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

W

- 万代蓉 快中子在 Li 核上的弹性散射微分截面 张 坤等 5 人 19(1995)879
 万陵德 有限温度阿贝尔格点规范理论相变的解析研究 刘文生等 4 人 18(1994)996
 探测中性 TC 矢量介子的可能性 岳崇兴等 3 人 19(1995)1096
 万淑颖 铜系核的电偶极矩 石宗仁等 2 人 19(1995)185
 铜系核集体运动的负宇称态 石宗仁等 2 人 19(1995)438
 汪伯嗣 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 汪晓莲 闪烁光纤光传输特性的研究 汪晓莲等 7 人 21(1997)787
 汪兆民 倾斜多丝正比室辐射状阴极条感应电荷重心读出的定位性能研究 汪兆民等 4 人 17(1993)685
 闪烁光纤光传输特性的研究 汪晓莲等 7 人 21(1997)787
 400 GeV / c pp 碰撞两粒子关联的角度依赖性 王韶舜等 3 人 21(1997)990
 汪忠吉 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 王保林 关于 sd IBM 中自洽 Q 框架的高阶效应 王保林等 3 人 17(1993)1048
 过渡区原子核低激发态的解析研究 18(1994)724
 sdg IBM 对稀土偶偶核基态形变的计算 19(1995)764
 1 / N 展开技术的一些应用 张庆营等 4 人 20(1996)252
 类 $O(6)$ 原子核三轴形变的解析描述 21(1997)745
 王冰峰 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
 王承瑞 族事例多心结构现象分析 范晓龄等 8 人 17(1993)486
 超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
 王传珊 $FeCl^+$ 轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
 王春芳 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(EC + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)285
 合成和研究滴线区新核素 β 延发质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
 王春红 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
 王德武 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13
 北京同步辐射装置 X 射线衍射实验站在材料科学研究中的应用 王德武等 2 人 19(1995)473
 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
 王德云 有效屏蔽势的能级和波函数 黄博文等 2 人 21(1997)757

- 王恩科 有限温度下非拓扑孤子模型的双圈有效势 邓胜华等 3 人 19(1995)713
- 王 凡 夸克激发与质子自旋 沈洪清等 6 人 18(1994)277
- 王 飞 重离子碰撞中 K 介子和 π 介子产生的统一动力学模拟 储自力等 5 人 20(1996)438
 熔合碎裂模型和 ALADIN 多重碎裂数据 王 飞等 4 人 20(1996)644
 弹剩余核衰变模式间竞争及其在 ALADIN 数据中的呈现 王 飞等 4 人 20(1996)729
- 王 锋 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow KK^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王 钢 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 王功利 BSRF 白光动态形貌实验系统 王功利等 5 人 21(1997)763
- 王光伟 多粒子模拟方法分析北京正负电子对撞机储存环束团长度拉伸效应 李 云等 2 人
 20(1996)950
- 王广君 p -A 作用的非弹性度及对靶核质量的依赖 荆贵茹等 4 人 18(1994)1057
- 王海东 用高纯锗 γ -谱仪借助滑动比较方法精密测量放射性核的 γ -射线能量 张天保等 5 人
 17(1993)202
 仲态电子偶素湮没辐射能量的改进测量 彭良强等 5 人 19(1995)987
- 王海桥 高能诱导核反应中的核碰撞几何与末态粒子的间歇行为 王海桥等 2 人 18(1994)235
 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人
 19(1995)703
- 王宏源 混频 $1/2 + m$ 腔微波电子枪束流动力学特性 赵振堂等 3 人 18(1994)664
- 王黄生 带三体势的 IBM1 的 $O(6)$ 极限对偶偶 Pt 核的应用 王黄生等 2 人 18(1994)91
- 王 辉 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线“膝”区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
 非完全熔合碎裂模型与核液气相变 王 辉等 4 人 21(1997)44
 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 王积成 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
 $4\pi\Delta E_\beta$ 探测器的建立及其在丰中子核素研究中的应用 王积成等 5 人 19(1995)653
 $28\text{MeV}/u$ ^{18}O 与全阻止厚天然铅靶反应中丰中子汞同位素的截面测量 王积成等 5 人
 19(1995)686
 元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张 立等 8 人 21(1997)891
- 王继华 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107

- 王继锁 双参数形变谐振子湮没算符高次幂的本征态 王继锁等 3 人 20(1996)703
双参数形变谐振子湮没算符高次幂本征态的量子统计性质 王继锁等 3 人 21(1997)793
- 王家慧 单胶子交换梯形近似下 Bethe-Salpeter 方程赝标解 卞建国等 2 人 18(1994)591
格点 Z_4 Higgs 场-规范场体系的相结构 19(1995)519
- 王家祥 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 王稼军 $U(N) \supset SP(N) \supset O(3)$ 的分支律 王稼军等 2 人 18(1994)269
- 王建伟 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 王建雄 利用具有两个 Higgs-doublets 的扩展标准模型对 LEP II 能量下 $t\bar{t}$ 产生过程的研究 张肇西等 4 人 17(1993)1081
在 LEP II 及 NLC 能量下 $e^+e^- \rightarrow b\bar{b}Z^0$ 和 $t\bar{t}Z^0$ 过程中 Higgs 粒子的观测效应 丁亦兵等 5 人 20(1996)982
- 王金川 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
TR4 终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
大动态范围二维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 王 经 50MeV / u ^{12}C 离子实验靶区出射中子角分布实验测量 李桂生等 6 人 17(1993)499
- 王景成 金属玻璃 $\text{Pd}_{79.5}\text{Ni}_4\text{Si}_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
- 王菊芳 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王 军 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 王 俊 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13
北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- 王临洲 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
核探测器中混合气配制新方法 王运永等 6 人 18(1994)1
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau}$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385

- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王灵淑 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S)的τ轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- ψ(2S) → ρπ 及 ψ(2S) → $\overline{KK}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S)强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γη、γη' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王曼 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S)的τ轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- ψ(2S) → ρπ 及 ψ(2S) → $\overline{KK}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S)强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γη、γη' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王萌 ψ(2S) → ρπ 及 ψ(2S) → $\overline{KK}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S)强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 北京谱仪上 J/ψ → γπ⁰、γη、γη' → 3γ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王玟琰 FeCl⁺ 轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
- 王明星 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
- 王牧歌 丰中子核 ¹⁴¹Xe、¹⁵²Ce、¹⁵³Nd 及 ¹⁶⁰Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- 王纳秀 利用加速器质谱计测量 ¹⁰Be 形成截面 刘联臻等 6 人 19(1995)786
- 王培玮 混合型插件件的三维场形分析和计算 王培玮等 3 人 20(1996)468
- 王佩良 τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97

- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王 平 J/ψ 强衰变中 $f_2'(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 北京谱仪亮度监测器 Bhabha 散射截面的蒙特卡罗计算 朱永生等 4 人 18(1994)503
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 王 琦 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
 耗散反应产物的电荷扩散与能量相干 卢 俊等 6 人 21(1997)825
- 王 群 夸克随机组合机制与激发态重子的产生 王 群等 2 人 18(1994)702
 e^+e^- 湮没中 $L=1$ 激发态重子的产生比例 王 群等 2 人 18(1994)807
 非饱和势模型关于 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q} \rightarrow h's$ 的 Monte-Carlo 模拟 王 群等 3 人 18(1994)902
 非弹性和集团数在高能极限下的行为 王 群等 3 人 19(1995)620
 $e^+e^- \rightarrow m(q\bar{q}) + ng$ 过程的颜色等效哈密顿量 王 群等 2 人 19(1995)791
 $q\bar{q} + ng$ 多部分子体系的色单态集 王 群等 2 人 19(1995)1100
- 王仁川 JBD 直线宇宙弦的量子束缚态 章世伟等 2 人 17(1993)1016

- QED中相互作用场的量子化 王仁川等 2 人 18(1994)1012
- 王瑞宏 AGS 能量下 $\pi^-\pi^-$ 的 Bose-Einstein 关联 冯中汉等 3 人 20(1996)142
- 王 山 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
- π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725
- 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人 17(1993)912
- 相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511
- π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630
- 王韶舜 400GeV / c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
- 400GeV / c pp 碰撞腰快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
- 400GeV / c pp 碰撞腰快度空间带电粒子数密度的研究 王韶舜等 6 人 18(1994)392
- 400GeV / c pp 碰撞多粒子产生的分形行为 王韶舜等 6 人 18(1994)975
- 400GeV / c pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
- 400GeV / c pp 碰撞中的多粒子关联、阶乘累积矩和关联积分 王韶舜等 5 人 19(1995)296
- 400GeV / c pp 碰撞腰快度分布涨落的分形分析 王韶舜等 6 人 19(1995)968
- 400GeV / c pp 碰撞产生粒子的方位角结构 王韶舜等 6 人 20(1996)297
- 阶乘累积矩与阶乘矩之比随相空间大小的变化 王韶舜等 4 人 20(1996)783
- 400GeV / c pp 碰撞连续阶数阶乘矩和多重分形分析 王韶舜等 4 人 21(1997)769
- 400GeV / c pp 碰撞两粒子关联的角度依赖性 王韶舜等 3 人 21(1997)990
- 王少敏 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J / ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J / ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J / ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J / $\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J / ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王士智 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
- 大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116
- 王淑琴 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 北京谱仪主漂移室的径迹重建 毛泽普等 5 人 17(1993)193
- 王淑英 用高纯锗 γ -谱仪借助滑动比较方法精密测量放射性核的 γ -射线能量 张天保等 5 人 17(1993)202
- 王书鸿 RFQ 加速器的束流动力学和高频结构 17(1993)310
- 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- BPL-RFQ 加速器束流动力学设计研究 罗紫华等 2 人 19(1995)658
- 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 王书暖 裂变过程的动力学和统计自治描述及不同方法之间的分析与比较 21(1997)264

- 王顺金 多体关联 Green 函数动力学 III. 截断近似 左 维等 2 人 17(1993)179
 多体关联格林函数动力学 IV. 相对论推广 左 维等 3 人 18(1994)616
 正则形式的 $SU(N)$ 规范理论的约束关联动力学 (I) 关联 Green 函数的运动方程 王顺金等 2 人 19(1995)270
 正则形式的 $SU(N)$ 规范理论的约束关联动力学 (II) 规范理论的约束条件 王顺金等 2 人 19(1995)332
 正则形式的 $SU(N)$ 规范理论的约束关联动力学 (III) 等时关联 Green 函数的运动方程与二体关联近似 郭 华等 2 人 19(1995)455
 正则形式的 QED 约束关联动力学 (I) 关联格林函数的运动方程 郭 华等 2 人 20(1996)48
 正则形式的 QED 约束关联动力学 (II) 等时关联格林函数的运动方程与二体关联近似 郭 华等 2 人 20(1996)131
 重子碰撞两体关联输运理论 I. 理论模型: 相干态表象的构造与基本运动方程 刘建业等 5 人 20(1996)1007
 重离子碰撞两体关联输运理论 III. 半经典近似下的数值计算 刘 航等 5 人 21(1997)169
 q 类似玻色算符的逆算符及其应用 韦联福等 3 人 21(1997)1031
- 王顺兴 微条气体室的研制 郁忠强等 5 人 20(1996)678
 微间隙室的研制 郁忠强等 5 人 21(1997)494
- 王素芳 $^{16}\text{O} + ^{nat}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
 $25\text{MeV} / \text{u}$ $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
 $25\text{MeV} / \text{u}$ $^{40}\text{Ar} + ^{nat}\text{Ag}$, ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 王泰杰 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 北京谱仪主漂移室的径迹重建 毛泽普等 5 人 17(1993)193
 e/π 识别的 dE/dx 方法在北京谱仪 τ 轻子质量测量中的应用 荣 刚等 6 人 17(1993)865
 判别分析法在北京谱仪粒子分辨中的应用 姜志进等 4 人 18(1994)1064
 北京谱仪中的初级顶点拟合 姜志进等 3 人 19(1995)1
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 用神经网络分辨原初宇宙线成份 梁化楼等 5 人 21(1997)205
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王文福 具有旋量场的量子虫洞 王文福等 3 人 18(1994)52
- 王文阁 动力学对称性研究的拓扑途径——互作用玻色子模型中的应用示例 傅德基等 4 人 17(1993)

- 1032
- 王希平 $p^3\text{He}$ 弹性散射动量空间库仑作用的研究 宋桂莲等 4 人 17(1993)763
- 王晓春 转动对超形变带能谱和 $M1$ 跃迁的影响 邢 正等 3 人 20(1996)750
- $^{149}\text{Gd}(b1)$ 和 $^{153}\text{Dy}(b1)$ 超形变带能量的 $\Delta I = 2$ Staggering 邢 正等 3 人 21(1997)1041
- 王晓秋 46.7 MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au , ^{115}In , ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
- 王晓荣 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 王 欣 虚时温度场论中的维数正规化及 QED 二圈热力学势 王 欣等 2 人 21(1997)216
- 王学雷 Technicolor 理论中的赝标格尔斯通粒子对 $t \rightarrow W^+ b$ 过程所产生的虚效应 王学雷等 5 人 18(1994)1086
- 一代 Technicolor 模型对稀有衰变 $t \rightarrow c\gamma$ 的贡献 王学雷等 4 人 19(1995)534
- C. D. Carone 模型中的 t 夸克稀有衰变 鲁公儒等 5 人 20(1996)414
- Z 衰变对 OGTM 与 MTC 模型的限制 王学雷等 3 人 20(1996)610
- TC 模型中 PGB 对 Tevatron 上 $t\bar{t}$ 产生截面的单圈修正 杨 华等 3 人 21(1997)591
- Technicolor 模型下 QCD 对衰变 $B \rightarrow X\tau\nu_\tau$ 的修正 鲁公儒等 4 人 21(1997)897
- 王雅茹 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 王延申 活动标架系下 $O(n)$ 非线性 σ 模型 Lax pair 矩阵的 Poisson-Lie 结构 王延申等 2 人 18(1994)892
- $SU(2)$ Thirring 模型边界算子的 Boson 表达式 王延申等 5 人 20(1996)216
- 王言山 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 王炎森 中子与 α 相互作用的两体等效可分离势 裘志洪等 5 人 17(1993)845
- 王彦瑜 对 ^{69}Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
- 王养丽 超形变带的两带混合模型 邢 正等 3 人 18(1994)62
- $A \sim 150$ 区超形变带唯象分析 陈星冀等 3 人 18(1994)256
- 王贻芳 神经网络在 $\tau \rightarrow \rho\nu_\tau$ 极化分析中的应用 张子平等 3 人 18(1994)769
- 王以好 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
- 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
- 王义芳 ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 王引书 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
- 王英才 重夸克偶素中的色屏蔽效应 董宇兵等 3 人 17(1993)472
- 王永昌 几个 (n, d^+) , (n, t) 和 $(n, n'\alpha)$ 反应截面的测量 王永昌等 4 人 17(1993)289
- $\text{Ba}(n, x)^{134}\text{Cs}$, $^{134}\text{Ba}(n, 2n)^{133}\text{Ba}$, $^{140}\text{Ce}(n, 2n)^{139}\text{Ce}$, $^{142}\text{Ce}(n, 2n)^{141}\text{Ce}$ 和 $^{23}\text{Na}(n, 2n)^{22}\text{Na}$ 反应截面的测量 孔祥忠等 4 人 19(1995)781
- 王有恒 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 王友智 用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378
- 多腔热阴极微波电子枪的实验研究 唐传祥等 6 人 21(1997)470
- 王玉成 相互作用玻色子模型的非厄米 Dyson 玻色子展开途径 邓卫真等 3 人 17(1993)907
- 王运永 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 核探测器中混合气配制新方法 王运永等 6 人 18(1994)1
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673

- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣刚等 13 人 20(1996)577
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 王蕴玉 掺硫和在不同温度下 InP 的正电子湮没研究 黄懋容等 6 人 20(1996)1097
- 王喆 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 王震遐 FeCl^+ 轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
- 王正清 高能强子-核作用中快度分布与横能的关联 冯笙琴等 2 人 19(1995)916
- 高能核-核作用中不同带电强子快度分布 冯笙琴等 2 人 20(1996)919
- 王正行 热核表面能的 Thomas-Fermi 统计模型理论 罗栓群等 2 人 19(1995)278
- 极端相对论性重离子碰撞横能分布的 Glauber 理论 王正行等 3 人 20(1996)234
- 王政之 在 高能碰撞中 e^+e^- 湮没的几率与间歇现象 20(1996)61
- 王志光 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
- 王志松 Fermi 能区核-核碰撞的平衡前中子发射 王志松等 2 人 18(1994)848
- 王忠民 不锈钢在 14.6 MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
- 王仲奇 几率分布指数率与间歇现象 张孝泽等 6 人 18(1994)160
- 再散射输运模型与 K^+/π^+ 比的系统学 王仲奇等 6 人 18(1994)567
- 相对论性核碰撞中 K^+/π^+ 增强的输运模型解释 王仲奇等 6 人 18(1994)741
- AGS 能量下核系统的强阻止性 宋光等 6 人 19(1995)172
- 王洲光 BSRF 白光动态形貌实验系统 王功利等 5 人 21(1997)763
- 王子兴 核的自旋横向响应函数 王子兴等 2 人 17(1993)367
- 韦联福 q 类似玻色算符的逆算符及其应用 韦联福等 3 人 21(1997)1031
- 魏宝文 HIRFL-CSR 电子冷却装置上的横向电子束温度 饶亦农等 4 人 20(1996)369
- 重离子的束内散射 饶亦农等 4 人 20(1996)430
- ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 储存环内电子冷却过程模拟 饶亦农等 4 人 21(1997)368
- 魏诚林 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89

- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 魏宏哲** 微条气体室的研制 郁忠强等 5 人 20(1996)678
- 微间隙室的研制 郁忠强等 5 人 21(1997)494
- 魏彦省** 在 $Z \rightarrow b\bar{b}$ 衰变中 Gluino 和 Squark 的质量效应 胡炳全等 4 人 17(1993)44
- 魏志勇** 46.7 MeV / u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
- 46.7 MeV / u $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
- 46.7 MeV / u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
- 46.7 MeV / u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
- 46.7 MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 10 人 18(1994)102
- 中等质量碎片的内部激发对同位素核温度的影响 魏志勇等 2 人 21(1997)615
- 中心集体流对带电粒子关联函数的影响 郝鸿飞等 4 人 21(1997)627
- 100 MeV / u Au + Au 对心碰撞中心集体流的发展 郝鸿飞等 5 人 21(1997)728
- 卫增泉** 低能电子径迹中能量沉积频率分布 李 强等 3 人 19(1995)1078
- 液态水中重离子径向剂量分布的计算 李 强等 3 人 20(1996)476
- 重离子 Bragg 峰的研究及其应用 李 强等 4 人 21(1997)571
- 温诚忠** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 温书贤** ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
- 高自旋态下 ^{160}Lu 能级自旋的确定 孙慧斌等 6 人 19(1995)929
- 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
- $^{128}\text{Ce } 16^+$ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
- ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
- $^{171}\text{Lu } 1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
- ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘 忠等 14 人 21(1997)881
- 文万信** $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
- 46.7 MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb 、 ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
- 25 MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
- 135 MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦 芝等 11 人 19(1995)481
- $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25 MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
- 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
- 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
- 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
- 双幻核 ^{100}Sn 的基态性质 文万信等 3 人 20(1996)148
- 25 MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
- 单极巨共振弛豫过程 文万信等 3 人 20(1996)546
- 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
- 热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870

- 翁惠民 金属玻璃 $\text{Pd}_{79.5}\text{Ni}_4\text{Si}_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
Al / GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
氟化锂团簇基纳米相薄膜的慢正电子研究 巨 新等 5 人 21(1997)844
- 翁培琨 ^{128}Ce 16^+ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
- 翁智群 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 邬恩九 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$, ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 吴崇试 奇质子核 $K = 1/2$ 带的带交叉 19(1995)1024
 $A \sim 190$ 区超形变带的 $\Delta I = 4$ 分岔 吴崇试等 3 人 20(1996)1028
一种改进的对力形式 21(1997)62
奇质量超形变带中的 $\Delta I = 1$ 颤动 21(1997)621
- 吴定清 42MeV / u ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
 $^{16}\text{O} + ^{115}\text{In}$ 反应的全熔合与非完全熔合 李文新等 5 人 18(1994)481
600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
6.3—24.6MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张 翔等 9 人 20(1996)21
中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- 吴 钢 等梯度加速结构瞬时束流负载效应的计算 黄永章等 2 人 18(1994)310
北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
用于微波电子枪的双重入腔及其阴极结构 黄永章等 2 人 18(1994)658
北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 吴和宇 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
46.7MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb , ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
三分裂中的级联裂变模式 吴和宇等 2 人 18(1994)730
25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$, ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 吴 华 在膨胀夸克-胶子等离子体相变过程中包含夸克碎块效应的动力学 李盘林等 3 人 21(1997)918
- 吴慧芳 ^{82}Se 的 $2\nu\beta\beta$ 衰变寿命和壳模型波函数 吴慧芳等 2 人 18(1994)366

- 吴济民 e^+e^- 对撞过程中辐射因子的严格计算 17(1993)146
 在 e^+e^- 对撞过程中 τ 轻子对产生的阈行为 吴济民等 2 人 17(1993)379
 BES 新测 τ 轻子质量的物理含意 吴济民等 2 人 17(1993)511
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 用独立元格等效作用量研究三维 $U(1)$ 格点规范理论的相结构 赵佩英等 2 人 20(1996)124
 关于格点规范理论中胶球质量数值计算结果的讨论 20(1996)894
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 吴坚武 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 吴靖民 应用 MORSE 程序计算中子的天空反散射 吴靖民等 2 人 19(1995)377
- 吴 可 量子偶和量子偶对——量子代数和量子群的关系 吴 可等 3 人 17(1993)262
 量子张量偶及量子群的实现 吴 可等 2 人 17(1993)796
- 吴连坳 偶偶核 γ 不稳定集体激发的新公式 吴连坳等 2 人 19(1995)941
 偶偶 γ 稳定核 Stretching 效应的微观机制 吴连坳等 2 人 19(1995)1047
 一个微观两参数核模型和它对超铀区核 Yrast 线的应用 吴连坳等 3 人 20(1996)182
 一个描述轴对称、过渡核 Yrast 带的新公式及核 γ 形变的一个特征量 吴连坳等 2 人 20(1996)339
 有效价核子对数的微观意义初探 吴连坳等 2 人 21(1997)257
- 吴 枚 小样本时皮尔森 χ^2 量概率分布的讨论 吴 枚等 4 人 18(1994)879
- 吴庆武 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 吴荣久 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
- 吴式枢 RPA 的复数本征解与相变 姚玉洁等 4 人 17(1993)757
 Hartree-Fock 解多重性的研究 井孝功等 5 人 17(1993)1026
- 吴顺光 核反应中的核结构效应 张竞上等 4 人 17(1993)745
- 吴为民 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 吴文庆 轴对称变形核中配对粒子态的构成 曾谨言等 3 人 19(1995)834
- 吴熙东 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 吴锡真 有限温度下多维裂变速率的量子修正 包景东等 3 人 17(1993)362
 核裂变扩散模型 Kramers 定态解的理论分析 冯仁发等 3 人 18(1994)361
 重原子核中单粒子的最邻近能级间距和能级曲率分布 顾建中等 4 人 21(1997)535
- 吴晓光 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 吴小华 快中子在 Li 核上的弹性散射微分截面 张 坤等 5 人 19(1995)879
- 吴秀文 K^+ 核散射与非线性密度相关修正 闵德芬等 6 人 17(1993)462
- 吴义根 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 吴应荣 北京正负电子对撞机 (BEPC) 4W1A 光束线光束中心监测与 X 光激发荧光信噪比的观测
 洪 蓉等 5 人 17(1993)403

- 同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
- 吴元芳 自仿射分形在碰撞多重产生中的应用 吴元芳等 2 人 18(1994)433
- 高能碰撞多粒子末态间歇现象与关联积分的研究 张 阳等 5 人 18(1994)621
- 高能多粒子产生反常标度性研究中的相空间变量选择 刘连寿等 2 人 20(1996)357
- 随机级联模型的连续标度行为 张 阳等 3 人 20(1996)715
- 强子-强子碰撞中硬分量存在的又一实验证据 刘红平等 4 人 21(1997)609
- 吴元明 用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378
- 多腔热阴极微波电子枪的实验研究 唐传祥等 6 人 21(1997)470
- 吴忠华 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
- 武家扬 三角形弯晶单色器的分光及聚焦特性研究 郑文莉等 5 人 19(1995)858
- 北京同步辐射装置 X 射线漫散射实验站及准周期非晶多层膜的 X 射线非镜面散射研究 姜晓明等 6 人 20(1996)460
- 武 青 质子的自旋危机问题 马维兴等 2 人 21(1997)362
- 武淑兰 Al / GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
- 武振东 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE / dx 粒子识别的研究 荣 刚等 13 人 20(1996)577
- 伍 健 确定 $\tau^+ \tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
- 北京谱仪上的 e / π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072

X

- 郝鸿飞 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
- 46.7MeV / u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
- 46.7MeV / u $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
- 46.7MeV / u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
- 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
- CsI(Tl) + 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481
- 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
- 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au , ^{115}In , ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
- 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
- TR4 终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
- 大动态范围双维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
- 中心集体流对带电粒子关联函数的影响 郝鸿飞等 4 人 21(1997)627
- 100MeV / u Au + Au 对心碰撞中心集体流的发展 郝鸿飞等 5 人 21(1997)728
- 席德明 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J / ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \tau^- \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^- \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J / ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673

- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 夏佳文** HIRFL-CSR 电子冷却装置上的横向电子束温度 饶亦农等 4 人 20(1996)369
重离子的束内散射 饶亦农等 4 人 20(1996)430
储存环内电子冷却过程模拟 饶亦农等 4 人 21(1997)368
- 夏绍建** BEPC 束流极化及极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
液氮冷却硅晶体单色器的研究 21(1997)664
- 夏小娟** 400GeV/c pp 碰撞快度空间带电粒子数密度的研究 王韶舜等 6 人 18(1994)392
- 夏小米** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 冼鼎昌** 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13
北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
- 肖臣国** 400GeV/c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
400GeV/c pp 碰撞快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
400GeV/c pp 碰撞快度空间带电粒子数密度的研究 王韶舜等 6 人 18(1994)392
400GeV/c pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
400GeV/c pp 碰撞多粒子产生的分形行为 王韶舜等 6 人 18(1994)975
400GeV/c pp 碰撞中的多粒子关联、阶乘累积矩和关联积分 王韶舜等 5 人 19(1995)296
400GeV/c pp 碰撞快度分布涨落的分形分析 王韶舜等 6 人 19(1995)968
400GeV/c pp 碰撞产生粒子的方位角结构 王韶舜等 6 人 20(1996)297
阶乘累积矩与阶乘矩之比随相空间大小的变化 王韶舜等 4 人 20(1996)783
400GeV/c pp 碰撞连续阶数阶乘矩和多重分形分析 王韶舜等 4 人 21(1997)769

- 肖 键 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 肖美琴 CYCLAE 型回旋加速器负离子剥离引出的光学行为研究 肖美琴等 3 人 20(1996)1110
- 肖延安 北京正负电子对撞机(BEPC)4W1A 光束线光束中心监测与 X 光激发荧光信噪比的观测
洪 蓉等 5 人 17(1993)403
同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
- 肖振军 Δr 的实验测量与唯象分析 肖振军等 3 人 17(1993)516
Technicolor 理论中的赝标格尔斯通粒子对 $t \rightarrow W^+ b$ 过程所产生的虚效应 王学雷等 5 人
18(1994)1086
 $b \rightarrow s\gamma$ 在 Multiscale Walking Technicolor 模型中的研究 鲁公儒等 4 人 21(1997)1005
- 肖振喜 不锈钢在 14.6 MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
- 谢 东 核探测器中混合气配制新方法 王运永等 6 人 18(1994)1
- 谢家麟 用于微波电子枪注入器的 α 磁铁的设计和制造 黄永章等 3 人 17(1993)790
北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378
多腔热阴极微波电子枪的实验研究 唐传祥等 6 人 21(1997)470
- 谢 汨 L^+ 算符和量子包络代数 谢 汨等 3 人 20(1996)617
- 谢佩佩 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow KK^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣 刚等 13 人 20(1996)577
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 谢去病 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}g$ 及 $\gamma \rightarrow 3g$ 碎裂的色弦结构 田丽丽等 3 人 17(1993)717
 Υ 的三胶子碎裂 田丽丽等 2 人 17(1993)885
夸克随机组合机制与激发态重子的产生 王 群等 2 人 18(1994)702
 e^+e^- 湮没中 $L=1$ 激发态重子的产生比例 王 群等 2 人 18(1994)807
非饱和势模型关于 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q} - h's$ 的 Monte-Carlo 模拟 王 群等 3 人 18(1994)902
非弹性度和集团数在高能极限下的行为 王 群等 3 人 19(1995)620
 $e^+e^- \rightarrow m(q\bar{q}) + n g$ 过程的颜色等效哈密顿量 王 群等 2 人 19(1995)791
 $q\bar{q} + n g$ 多部分子体系的色单态集 王 群等 2 人 19(1995)1100
- 谢小希 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289

- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 谢秀君 47MeV / u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- 谢亚宁 用北京同步辐射光源研究氟化物闪烁体的荧光时间衰减特性 蒋海音等 7 人 20(1996)1103
- 谢一冈 Z^0 能区正负电子湮没强子多重数分布的近泊松形式与肩状结构 谢一冈等 2 人 18(1994)778
 判别分析法在北京谱仪粒子分辨中的应用 姜志进等 4 人 18(1994)1064
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 Z^0 能区正负电子湮没强子多重数分布及有关参数 谢一冈等 4 人 20(1996)972
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 谢 昱 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- 谢元祥 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 ($\text{EC} + \beta^+$) 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)289
 $\text{NE102A} + \text{CsI(Tl)} + \text{PMT}$ 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
 合成和研究滴线区新核素 β 延发质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 谢跃红 在 LEP II 及 NLC 能量下 $e^+e^- \rightarrow b\bar{b}Z^0$ 和 $t\bar{t}Z^0$ 过程中 Higgs 粒子的观测效应 丁亦兵等 5 人 20(1996)982
 北京 τ -c 工厂 (BTCF) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- 解 卫 用神经网络分辨原初宇宙线成份 梁化楼等 5 人 21(1997)205
 大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116
- 解文方 用 α 粒子模型描写 800MeV 的 $p-^{40}\text{Ca}$ 散射 阮文英等 2 人 19(1995)264
 ^{12}C 基态和低激发态微观结构的对称性分析 解文方等 2 人 19(1995)848
 对称性对总自旋为 $1/2$ 的三费米体系结构的影响 解文方等 2 人 20(1996)92
 三粒子系统的“Q 效应” 21(1997)465
- 辛明瑞 HgCdTe 中特征正电子湮没寿命值的确定 何元金等 3 人 18(1994)752
- 邢建萍 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 ($\text{EC} + \beta^+$) 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)289
- 邢永忠 关于核多体系统的基态关联效应 邢永忠等 2 人 21(1997)1024
- 邢 正 从正常形变看超形变带角动量的确定 陈星冀等 2 人 17(1993)1102
 超形变带的两带混合模型 邢 正等 3 人 18(1994)62
 $A \sim 150$ 区超形变带唯象分析 陈星冀等 3 人 18(1994)256
 粒子-转子模型分析超形变转动带 陈星冀等 2 人 18(1994)448
 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 奇 A 核超形变全同带分析 邢 正等 2 人 19(1995)354
 $^{157,159}\text{Tm}$ 基态附近性质的研究 邢 正等 3 人 20(1996)85
 奇 $A^{117-125}\text{Cs}$ 核 $\pi h_{11/2}$ 带的研究 邢 正等 5 人 20(1996)639
 转动对超形变带能谱和 $M1$ 跃迁的影响 邢 正等 3 人 20(1996)750

- $^{149}\text{Gd}(\text{b}1)$ 和 $^{153}\text{Dy}(\text{b}1)$ 超形变带能量的 $\Delta I = 2$ Staggering 邢正等 3 人 21(1997)1041
- 邢志忠 夸克质量矩阵与 CP 对称性破坏 19(1995)667
- 熊伟军 400GeV / c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
 400GeV / c pp 碰撞横快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
 400GeV / c pp 碰撞横快度空间带电粒子数密度的研究 王韶舜等 6 人 18(1994)392
 400GeV / c pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \overline{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 北京 τ -c 工厂(BTCF)快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 熊兆华 $b \rightarrow s\gamma$ 在 Multiscale Walking Technicolor 模型中的研究 鲁公儒等 4 人 21(1997)1005
 用 Technicolor 理论研究稀有辐射衰变 $B_c \rightarrow D_s^* \gamma$ 鲁公儒等 4 人 21(1997)413
 Technicolor模型下 QCD 对衰变 $B \rightarrow X\tau\nu_\tau$ 的修正 鲁公儒等 4 人 21(1997)897
- 修立松 北京同步辐射装置 X 射线漫散射实验站及准周期非晶多层膜的 X 射线非镜面散射研究
 姜晓明等 6 人 20(1996)460
- 徐春娴 银河宇宙线的统计模型 徐春娴等 2 人 21(1997)486
 大气切伦科夫望远镜 姜印琳等 7 人 21(1997)583
- 徐德之 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \overline{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 徐东辉 2 + 1 维 CP¹模型拓扑项可移性研究 高孝纯等 2 人 19(1995)413
- 徐辅新 转动谱公式的综合研究 徐辅新等 2 人 17(1993)1040
- 徐躬耦 IBM-II连续变量表示动态运动方程的解 狄尧民等 4 人 17(1993)559
 动力学对称性研究的拓扑途径——互作用玻色子模型中的应用示例 傅德基等 4 人
 17(1993)1032
- ^{100}Sn 核基态性质的微观研究 任中洲等 2 人 19(1995)1029
 关于核多体系统的基态关联效应 邢永忠等 2 人 21(1997)1024

- 徐瑚珊 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 $\text{NE102A} + \text{CsI(Tl)} + \text{PMT}$ 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
 耗散反应产物的电荷扩散与能量相干 卢 俊等 6 人 21(1997)825
- 徐纪华 金属玻璃 $\text{Pd}_{79.5}\text{Ni}_4\text{Si}_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
 Al / GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
- 徐家跃 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
- 徐加豹 相对论微观光学势中相互作用力程的效应 朱 萍等 3 人 17(1993)549
- 徐建国 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 徐建铭 存在耦合情况下 SYNCH 和 MAD 程序计算结果的分析 18(1994)955
 有横向耦合的束流系统的匹配问题 19(1995)73
 纵向阻尼系统 19(1995)567
 束测误差对阻尼系统的影响 19(1995)1052
- 徐金强 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 徐景伟 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 徐 侃 $84.0\text{MeV } ^{16}\text{O}$ 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
 $^{16}\text{O} + ^{\text{nat}}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
 垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
- 徐连联 ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
- 徐勉海 确定 $\tau^+ \tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变道事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
- 徐 霓 转动谱公式的综合研究 徐辅新等 2 人 17(1993)1040
- 徐蓉芬 Z^0 能区正负电子湮没强子多重数分布及有关参数 谢一冈等 4 人 20(1996)972
- 徐树威 用单能 γ 射线源校刻 β 塑料闪烁体能谱仪 潘强岩等 4 人 17(1993)391
 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
 实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
 丰中子同位素 ^{189}W β -衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 ALICE 程序在重离子反应中的应用 袁双贵等 4 人 17(1993)1065
 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC / β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 $^{157,159}\text{Tm}$ 基态附近性质的研究 邢 正等 3 人 20(1996)85
 对称裂变中惯性张量的计算 张学谦等 5 人 21(1997)58
 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(\text{EC} + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)289
 合成和研究滴线区新核素 β 延迟质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 徐四大 氦喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068
- 徐万里 $400\text{GeV} / c$ pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
- 徐 望 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(\text{EC} + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)289
 BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
- 徐文轩 用同步辐射小角衍射方法研究多层膜周期结构 王 俊等 7 人 18(1994)13

- 徐晓冀 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
 ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
 对质子滴线核 ^{19}Na 的 β 延迟质子衰变的首次观察 徐晓冀等 12 人 19(1995)203
 新核素 ^{65}Se 半衰期的首次实验测定 黄文学等 4 人 20(1996)113
 对 ^{69}Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
- 徐在新 矢量玻色子分布函数 17(1993)619
- 徐正良 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1996)82
- 徐芷菁 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 核探测器中混合气配制新方法 王运永等 6 人 18(1994)1
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 许长补 气体探测器雪崩过程的研究 许长补等 3 人 19(1995)116
- 许定安 用 CHHE-MRT 方法研究 3- α 集团基态 李世清等 3 人 17(1993)1116
- 许甫荣 原子核振动与转动模型 (I) 推转玻尔-莫特逊哈密顿量和偶偶核正常转动谱分析 胡济民等 3 人 20(1996)76
 原子核的振动与转动模型 (II) 奇 A 核正常转动谱分析 胡济民等 3 人 20(1996)259
 应用原子核的宏观-微观模型研究远离稳定线核的性质 郑春开等 3 人 20(1996)317
 原子核的振动与转动模型 (III) $A \sim 190$ 区超形变带研究 许甫荣等 3 人 20(1996)554
- 许国材 带 Wilson 费米子的格点 Schwinger 模型中 $\langle\bar{\psi}\psi\rangle$ 的变分研究 许国材等 3 人 17(1993)1011
 带有质量的 Wilson 费米子的格点 Schwinger 模型中 M_π 对 m 的变化率的计算 江俊勤等 3 人 18(1994)222
- 许国发 高能核-核碰撞的靶核黑碎片发射 刘福虎等 2 人 17(1993)494
 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 许谨诚 84.0MeV ^{16}O 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
 $^{16}\text{O} + ^{nat}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6

- 垒下 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 裂变碎片角关联模拟 钱 兴等 6 人 18(1994)385
 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
 垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
 预平衡裂变 刘祖华等 6 人 20(1996)107
 用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
 $^{19}\text{F} + ^{208}\text{Pb}$ 近垒及垒下准弹反应 林承键等 6 人 21(1997)872
- 许梦杰 在膨胀夸克-胶子等离子体相变过程中包含夸克碎块效应的动力学 李盘林等 3 人 21(1997)918
 许明康 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 许榕生 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 许 彤 气体探测器雪崩过程的研究 许长补等 3 人 19(1995)116
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
- 许晓明 用手征夸克孤子模型计算氦的性质 许晓明等 2 人 17(1993)65
 $p\bar{p}$ 湮没成双介子的相对论处理 17(1993)929
- 许亚娣 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 许咨宗 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
 多丝室工作于自猝灭流光模式下定位特性的研究 陈宏芳等 5 人 17(1993)582
 倾斜多丝正比室辐射状阴极条感应电荷重心读出的定位性能研究 汪兆民等 4 人 17(1993)685
 气体探测器雪崩过程的研究 许长补等 3 人 19(1995)116
 气体雪崩过程中光电信号的时间关联 许咨宗等 4 人 19(1995)775
 气体雪崩放电的单光子测量时间谱 韩家祥等 5 人 20(1996)885

- 闪烁光纤光传输特性的研究 汪晓莲等 7 人 21(1997)787
- 宣百辞 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 薛松 北京同步辐射软 X 光反射率计装置及其物理工作 崔明启等 10 人 19(1995)82
- 薛生田 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李金等 11 人 19(1995)209
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \overline{KK}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961

Y

- 严启伟 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 严武光 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 过程 $J/\psi \rightarrow \gamma X, X \rightarrow P_1 P_2$ 中 X 自旋的矩分析法 陈申见等 3 人 17(1993)961
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \overline{KK}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 颜洁 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289

- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 北京谱仪大型精密圆柱漂移室 dE/dx 粒子识别的研究 荣 刚等 13 人 20(1996)577
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 颜 骏 两维引力中的一种可积模型 颜 骏等 3 人 17(1993)322
 亏格 g Riemann 曲面上比热的模对偶性质 颜 骏等 2 人 17(1993)534
 Baby 宇宙中的非阿贝尔蛙洞解 颜 骏等 3 人 17(1993)605
 10 维超引力模型的稳定紧致化 颜 骏等 2 人 17(1993)692
 阎德宏 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
 46.7MeV / A ^{12}C 轰击 $^{159}\text{Tb}, ^{197}\text{Au}$ 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
 20MeV 到 180MeV / u $^{16}\text{O} + ^{197}\text{Au}$ 系统的 BUU 计算: 线动量与角动量转移依赖碰撞参数与能量研究 阎德宏等 5 人 18(1994)1035
 阎 宏 $U_q(sl_2)$ 的两维循环表示和八顶角 Ising 模型 张 军等 3 人 19(1995)1005
 $U_q(sl(2))$ 的二维循环表示, C-G 系统和一个自由费米子八顶角模型 张 军等 3 人 19(1995)1084
 编织假设与杨-Baxter 方程的解 张 军等 3 人 21(1997)714
 阎沐霖 背景场中夸克模型的味无关轴矢流 陈 昆等 2 人 17(1993)114
 阎循领 核-核碰撞的独立源模型及中心快度区末态产生粒子横能量分布 姜志进等 3 人 19(1995)508
 $U(1)$ 规范理论的定量分析 阎循领等 3 人 19(1995)527
 阎永廉 BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
 闫永和 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
 杨宝胜 重离子深光学势和宇称相关作用 高成群等 3 人 17(1993)665
 相同质量 $4N$ 核间的半微观光学势 周全华等 3 人 18(1994)460
 质量相近 $4N$ 核间宇称相关势的折叠模型 周全华等 3 人 18(1994)1051
 $^{20}\text{Ne} + ^{12}\text{C}$ 系统与深光学势下的双 α 转移效应 高成群等 3 人 20(1996)159
 杨长根 L3 中心径迹室顶点位置分辨的改进 杨长根等 5 人 18(1994)687
 L3 实验测量 τ 寿命的拟合方法及其误差讨论 杨长根等 5 人 18(1994)794
 杨长友 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673

- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 杨成章** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 杨春敏** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 杨春祥** ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘忠等 14 人 19(1995)106
- 高自旋态下 ^{160}Lu 能级自旋的确定 孙慧斌等 6 人 19(1995)929
- 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
- ^{128}Ce 16^+ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
- ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
- ^{171}Lu $1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
- 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 杨纯** $400 \text{ GeV}/c$ pp 碰撞质快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
- 杨纯斌** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- 重味展开下的 0^- 重介子束缚态 杨纯斌等 2 人 19(1995)327
- BNL / AGS 10.7 A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 同位旋守恒对奇异性产生的约束 杨纯斌等 3 人 20(1996)991
- 杨峰** $^{19}\text{F} + ^{208}\text{Pb}$ 近垒及垒下准弹反应 林承键等 6 人 21(1997)872
- 杨光参** $U_q(sl_2)$ 的两维循环表示和八顶角 Ising 模型 张军等 3 人 19(1995)1005

- $U_q(sl(2))$ 的二维循环表示, C-G系数和一个自由费米子八顶角模型 张 军等 3 人 19(1995)1084
- 杨洪庭 ^{171}Lu $1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- 杨 华 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- C. D. Carone 模型中的 t 夸克稀有衰变 鲁公儒等 5 人 20(1996)414
- Z 衰变对 OGTM 与 MTC 模型的限制 王学雷等 3 人 20(1996)610
- TC 模型中 PGB 对 Tevatron 上 $t\bar{t}$ 产生截面的单圈修正 杨 华等 3 人 21(1997)591
- 杨焕雄 (广义)BFOFW 模型的 Hamilton 程式及其量子化 侯伯宇等 2 人 17(1993)524
- 杨建军 夸克激发与质子自旋 沈洪清等 6 人 18(1994)277
- 改进的部分子演化模型及其对 EMC 效应和核 Drell-Yan 过程的解释 于明俭等 5 人 18(1994)1107
- 非微扰夸克传播子与核子结构函数的非平庸 Q^2 依赖性研究 杨建军等 3 人 21(1997)146
- 杨 杰 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow KK^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 杨金民 有限温度阿贝尔格点规范理论相变的解析研究 刘文生等 4 人 18(1994)996
- Technicolor 理论中的赝标格尔斯通粒子对 $t \rightarrow W^+ b$ 过程所产生的虚效应 王学雷等 5 人 18(1994)1086
- 一代 Technicolor 模型对稀有衰变 $t \rightarrow c\nu$ 的贡献 王学雷等 4 人 19(1995)534
- C. D. Carone 模型中的 t 夸克稀有衰变 鲁公儒等 5 人 20(1996)414
- 杨景康 几个 (n, d^*) , (n, t) 和 $(n, n' \alpha)$ 反应截面的测量 王永昌等 4 人 17(1993)289
- $\text{Ba}(n, x)^{134}\text{Cs}$, $^{134}\text{Ba}(n, 2n)^{133}\text{Ba}$, $^{140}\text{Ce}(n, 2n)^{139}\text{Ce}$, $^{142}\text{Ce}(n, 2n)^{141}\text{Ce}$ 和 $^{23}\text{Na}(n, 2n)^{22}\text{Na}$ 反应截面的测量 孔祥忠等 4 人 19(1995)781
- 杨景奎 $p\text{-}^3\text{He}$ 弹性散射动量空间库仑作用的处理 杨景奎等 2 人 20(1996)350
- 杨巨华 掺硫和在不同温度下 InP 的正电子湮没研究 黄懋容等 6 人 20(1996)1097
- 杨康树 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
- 杨孔庆 宇宙弦的弦张力 20(1996)138
- 共形变换与自对偶场的辛结构 杨孔庆等 2 人 20(1996)789
- 杨立铭 维数正规化和 NJL 模型 π 介子性质 张建玮等 4 人 18(1994)821
- 杨茂志 利用具有两个 Higgs-doublets 的扩展标准模型对 LEP II 能量下 $t\bar{c}$ 产生过程的研究 张肇西等 4 人 17(1993)1081
- 荷电标量介子对光子与光子散射振幅贡献的精确解析表达式 杨茂志等 3 人 19(1995)727
- 杨善德 Hartree-Fock 解多重性的研究 井孝功等 5 人 17(1993)1026
- 杨维凡 47MeV/u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
- 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
- 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
- ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296

- 新重丰中子同位素²³⁹Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
- 新重丰中子同位素¹⁷⁵Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
- 超铀区缺中子新同位素²³⁵Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- ¹⁷⁵Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
- 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
- 中能¹²C + ¹⁹⁷Au 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- ²²⁹Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
- 新丰中子同位素¹⁸⁶Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 杨 蔚 高能不等核碰撞和弛豫时间的 Fokker-Planck 方程描述 白 鸽等 3 人 17(1993)57
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho \pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K \bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 杨文力 玻色超共形 Toda 模型与 Dressing 变换 赵 柳等 2 人 17(1993)338
- Z_n 格点模型的量子仿射变形代数 石康杰等 4 人 19(1995)229
- $SU(2)$ Thirring 模型边界算子的 Boson 表达式 王延申等 5 人 20(1996)216
- 用玻色化顶点算子实现与 Z_n 对称的 Belavin R 矩阵相关的 Z -F 代数 石康杰等 4 人 21(1997)706
- 杨照荣 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 杨晓峰 相对论重离子碰撞的末态 π 介子横动量分布 21(1997)51
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma \pi^0, \gamma \eta, \gamma \eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 杨学平 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 杨亚东 PGBs 对高能 e^+e^- 湮没产生顶夸克对的单圈量子效应 鲁公儒等 3 人 20(1996)522
- 用 Technicolor 理论研究稀有辐射衰变 $B_c \rightarrow D_s^* \gamma$ 鲁公儒等 4 人 21(1997)413
- 杨亚天 动力学对称性研究的拓扑途径——相互作用玻色子模型中的应用示例 傅德基等 4 人 17(1993)1032
- 杨 易 $u\bar{u} \rightarrow s\bar{s}$ 过程的胶子交换势与 $p\bar{p} \rightarrow \Lambda\bar{\Lambda}$ 过程的反应截面 杨 易等 4 人 18(1994)85
- 杨永峰 47MeV/u ¹²C 同 ¹³³Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
- ²⁰⁸Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
- $4\pi\Delta E_{\beta}$ 探测器的建立及其在丰中子核素研究中的应用 王积成等 5 人 19(1995)653
- 95MeV/u 的 ¹²C 炮弹产生的二次束流强度研究 杨永峰等 3 人 19(1995)980
- 对 ⁶⁹Kr β 延迟质子衰变的观察 徐晓冀等 7 人 21(1997)286
- 中能¹²C + ¹⁹⁷Au 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- 元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张 立等 8 人 21(1997)891

- 杨永栩 Eikonal 近似在大角度一定不好吗? 杨永栩等 2 人 17(1993)469
 α 粒子散射对 ^{16}O 集团结构的检验 李清润等 2 人 18(1994)439
 碳重离子散射研究 李清润等 2 人 18(1994)748
 通过 $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C}$ 散射对两种不同模型的一个比较 李清润等 2 人 18(1994)1115
 $^{12}\text{C} + ^{12}\text{C}$ 散射激发函数 李清润等 2 人 19(1995)374
 $^{16}\text{O} + ^{12}\text{C}$ 系统的折叠模型 李清润等 2 人 20(1996)277
 124MeV 下 $^{16}\text{O} + ^{16}\text{O}$ 弹性散射的折叠模型 杨永栩等 2 人 21(1997)645
- 杨越 热阴极微波电子枪模拟计算 唐传祥等 3 人 20(1996)376
- 杨泽霖 相互作用玻色子模型的非厄米 Dyson 玻色子展开途径 邓卫真等 3 人 17(1993)907
 维数正规化和 NJL 模型 π 介子性质 张建玮等 4 人 18(1994)821
- 羊亚平 量子代数 $SU_q(4)$ 的不可约表示 羊亚平等 2 人 17(1993)423
- 姚宏宾 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 姚立山 ^{16}O 中子全截面的色散光学模型研究 21(1997)740
- 姚晓霞 改进的 Q^2 -重标度模型与部分子分布函数的核效应 姚晓霞等 5 人 21(1997)548
 价夸克分布与海夸克分布的核效应 侯召宇等 4 人 21(1997)639
- 姚玉洁 RPA 的复数本征解与相变 姚玉洁等 4 人 17(1993)757
 Hartree-Fock 解多重性的研究 井孝功等 5 人 17(1993)1026
- 叶邦角 不锈钢在 14.6MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
- 叶红 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 叶铭汉 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 叶诗章 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 叶树伟 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变道事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 在 BES 实验中用神经网络法鉴别 e, μ, π 张子平等 4 人 21(1997)297
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 叶巍 10.6MeV/u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶巍等 12 人 21(1997)1
- 用力学模型计算 10.6MeV/u $^{84}\text{Kr}(^{27}\text{Al}, \text{准裂变})$ 反应的裂变时间 叶巍等 6 人 21(1997)348
- 叶沿林 中能重离子碰撞中线动量耗散动力学 黄小临等 5 人 18(1994)154
- 垒下 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 裂变碎片角关联模拟 钱兴等 6 人 18(1994)385
- $\phi 76\text{mm} \times 100\text{mm}$ BGO 闪烁探测器探测效率测量 刘昕等 5 人 18(1994)496
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 叶云秀 400GeV/c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
- 400GeV/c pp 碰撞赝快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
- 400GeV/c pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
- 400GeV/c pp 碰撞多粒子产生的分形行为 王韶舜等 6 人 18(1994)970
- 400GeV/c pp 碰撞中的多粒子关联、阶乘累积矩和关联积分 王韶舜等 5 人 19(1995)296
- 400GeV/c pp 碰撞赝快度分布涨落的分形分析 王韶舜等 6 人 19(1995)968
- 400GeV/c pp 碰撞产生粒子的方位角结构 王韶舜等 6 人 20(1996)297
- 相对论核-核碰撞中产生的 Λ 粒子的横向极化度与横向动量的关联 叶云秀等 5 人 20(1996)685
- 阶乘累积矩与阶乘矩之比随相空间大小的变化 王韶舜等 4 人 20(1996)783
- 400GeV/c pp 碰撞连续阶数阶乘矩和多重分形分析 王韶舜等 4 人 21(1997)769
- 叶子飘 氦喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068

- 易 凯 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau}$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 易荣清 北京同步辐射装置软 X 光束通量谱的绝对测量与计算 崔明启等 6 人 20(1996)847
- 殷国利 仲态电子偶素湮没辐射能量的改进测量 彭良强等 5 人 19(1995)987
- 殷锡金 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^{+} 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
- 殷 旭 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
- 殷子文 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
- 尹淑芝 46.7MeV / u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 46.7MeV / u $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 46.7MeV / u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au 、 ^{115}In 、 ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{Ag}$ 、 ^{209}Bi 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 尹新民 42MeV / u ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
 600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
 40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
 20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
 6.3—24.6MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{\text{nat}}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张 翔等 9 人 20(1996)21
- 应和平 集团蒙特卡罗方法对一维量子 X-Y 模型的研究 季达人等 4 人 19(1995)42
- 应润杰 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 于传松 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961

- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 于建中 $u\bar{u} \rightarrow s\bar{s}$ 过程的胶子交换势与 $p\bar{p} \rightarrow \Lambda\bar{\Lambda}$ 过程的反应截面 杨 易等 4 人 18(1994)85
 于 进 激光驱动光阴极高亮度电子束源以及新型光阴极的研究 耿荣礼等 3 人 21(1997)67
 于 舸 双参数变形量子代数 $SU(1, 1)_{q,s}$ 的 Nodvik 实现和 Holstein-Primakoff 实现 于肇贤等 4 人 20(1996)1082
 于明俭 小 x 区域部分子演化模型的改进 于明俭等 3 人 17(1993)861
 改进的部分子演化模型及其对 EMC 效应和核 Drell-Yan 过程的解释 于明俭等 5 人 18(1994)1107
 于 遇 600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
 ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
 非全熔合反应裂变角分布 刘国兴等 4 人 21(1997)777
 于肇贤 利用 $SU(2)_{q,s}$ 量子代数的两参数变形振子实现讨论 $SU(2)_{q,s}$ 相干态 于肇贤等 4 人 19(1995)258
 双参数变形量子代数 $SU(1, 1)_{q,s}$ 的 Nodvid 实现和 Holstein-Primakoff 实现 于肇贤等 4 人 20(1996)1082
 双参数变形多模玻色算符的代数结构及其应用 (I) 于肇贤等 4 人 21(1997)999
 于祖荣 量子代数 $SU_q(4)$ 的不可约表示 羊亚平等 2 人 17(1993)423
 虞孝麒 不锈钢在 14.6MeV 中子轰击下质子发射的能谱和角分布 范扬眉等 7 人 21(1997)211
 虞炎华 确定 $\tau^+\tau^-\rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变道事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 余光策 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
 余光泽 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 余建国 质子治疗装置的束流扩展研究 余建国等 2 人 21(1997)851
 余扬政 3 维 $N = 1$ 超引力理论和超 Higgs 效应 18(1994)213
 余友文 重夸克偶素中的色屏蔽效应 董宇兵等 3 人 17(1993)472
 不同特点的禁闭位和高组态混合效应对 N, Δ 能谱的影响 董宇兵等 2 人 17(1993)651
 色屏蔽效应与核子-核子相互作用 沈肖雁等 4 人 17(1993)816
 用夸克集团模型推导的 $S = -1$ 的 NY 系统的等效定域势 沈彭年等 4 人 17(1993)941
 $b\bar{b}$ 体系中的色屏蔽效应 董宇兵等 4 人 18(1994)547
 夸克势模型中的重子-重子相互作用自旋-轨道耦合势 齐利杰等 4 人 18(1994)757
 N - N 相互作用中自旋轨道耦合力的夸克模型 张建华等 5 人 19(1995)87

- 夸克-夸克等效相互作用与手征对称性 余友文等 4 人 19(1995)431
 $SU(3)$ 模型中夸克与手征场的相互作用 张宗焯等 3 人 20(1996)363
- 余玉兰 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 余志堂 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 余自强 相对论重离子反应的热化过程 李祝霞等 4 人 18(1994)559
核内核子-核子非弹散射截面(I) 茅广军等 4 人 19(1995)540
核内核子-核子非弹散射截面(II) 茅广军等 4 人 19(1995)628
- 俞安孙 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 郁宏 用推广的矩分析方法确定过程 $J/\psi \rightarrow V_1 + X, X \rightarrow V_2 + V_3$ 中粒子 X 的自旋-宇称 沈齐兴等 2 人 17(1993)503
 J/ψ 强衰变产生的 $\theta(1720)$ 宽共振峰的研究 郁宏等 5 人 17(1993)601
矩分析法与 $\xi(2220)$ 郁宏等 2 人 17(1993)892
 $J/\psi \rightarrow V_1 + X, X \rightarrow \gamma + V_2$ 中玻色共振态 X 的自旋和宇称的确定 沈齐兴等 2 人 17(1993)988
 $e^+ + e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow V + X, X \rightarrow 3P$ 过程的角度分布螺旋度形式 张吉龙等 3 人 18(1994)43
 $e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-, \tau^- \rightarrow a_1^-\nu\tau, a_1^- \rightarrow \rho\pi$ 过程的角度分布和 a_1 介子的性质 郁宏等 3 人 18(1994)583
一个可能的新共振态—— $J/\psi \rightarrow X + f_0(975)$ 过程中玻色共振态 X 的自旋-宇称分析 郁宏等 2 人 18(1994)1143
 J/ψ 三级二体衰变过程中产生的玻色共振态的研究 沈齐兴等 3 人 19(1995)16
过程 $e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow V + X(J^{PC})$, $X \rightarrow 3P$ 的矩分析 张霖等 3 人 19(1995)800
用推广的矩分析方法确定 $J/\psi \rightarrow X + f_0(980)$ 中玻色共振态 X 的自旋-宇称 沈齐兴等 2 人 20(1996)45
对过程 $e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow \gamma + X(J^{PC})$, $X \rightarrow B\bar{B}$ (重子, 反重子) 的角度分布和共振态 X 的自旋-宇称分析 张霖等 3 人 20(1996)280
强子衰变过程 $J/\psi \rightarrow \omega\pi^+\pi^-$ 中的多道耦合 郁宏等 2 人 21(1997)123
 J/ψ 衰变过程的矩分析和两种坐标系的比较 沈齐兴等 3 人 21(1997)408
- 郁庆长 带电粒子束在非线性周期场中的传输 17(1993)305
束流光学中的变换群 (I) 一般理论 17(1993)878
束流光学中的变换群 (II) 束流光学单元与系统 18(1994)114
带电粒子束传输的相函数理论 19(1995)468
质子治疗装置的束流扩展研究 余建国等 2 人 21(1997)851
带电粒子束的等时周期场聚焦 21(1997)1046
- 郁忠强 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^+\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
北京谱仪上宇宙线 μ 样本的选择 顾建辉等 2 人 20(1996)26
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193

- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 微条气体室的研制 郁忠强等 5 人 20(1996)678
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 微间隙室的研制 郁忠强等 5 人 21(1997)494
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 喻传赞** 银河宇宙线核传播的蒙特卡罗模拟 张 力等 4 人 17(1993)589
- 喻纯旭** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 袁观俊** ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
 ^{128}Ce 16^+ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
 ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
 ^{162}Lu 的高自旋态及 $A=160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘 忠等 14 人 21(1997)881
- 袁 坚** $^{56,57}\text{Fe}, ^{59}\text{Co}(\alpha, d)$ 核反应及拉长态性质的实验研究 袁 坚等 5 人 20(1996)32
- 袁俊谦** 几个 (n, d^*) , (n, t) 和 $(n, n'\alpha)$ 反应截面的测量 王永昌等 4 人 17(1993)289
 $\text{Ba}(n, x)^{134}\text{Cs}$, $^{134}\text{Ba}(n, 2n)^{133}\text{Ba}$, $^{140}\text{Ce}(n, 2n)^{139}\text{Ce}$, $^{142}\text{Ce}(n, 2n)^{141}\text{Ce}$ 和 $^{23}\text{Na}(n, 2n)^{22}\text{Na}$ 反应截面的测量 孔祥忠等 4 人 19(1995)781
- 袁 澎** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线“膝”区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
- 袁 平** ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 袁双贵** 用单能 γ 射线源校刻 β 塑料闪烁体能谱仪 潘强岩等 4 人 17(1993)391

- 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
 实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 ALICE 程序在重离子反应中的应用 袁双贵等 4 人 17(1993)1065
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
 ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
 对称裂变中惯性张量的计算 张学谦等 5 人 21(1997)58
 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
 ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 袁湘龙** 掺铈氟化钡闪烁晶体荧光特性的研究 许咨宗等 7 人 17(1993)107
袁秀青 多重碎裂和相互作用势的涨落 李君清等 5 人 20(1996)332
 在中能重离子反应中核子的运动特征 李君清等 4 人 20(1996)839
袁余奎 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线“膝”区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
- 原有进** HIRFL-CSR 电子冷却装置上的横向电子束温度 饶亦农等 4 人 20(1996)369
 重离子的束内散射 饶亦农等 4 人 20(1996)430
 储存环内电子冷却过程模拟 饶亦农等 4 人 21(1997)368
- 苑长征** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 岳崇兴** TC 理论中矢量介子衰变研究 岳崇兴等 2 人 17(1993)1002
 t 夸克圈对 TC 理论的中性 PG 玻色子反常耦合的影响 岳崇兴等 2 人 19(1995)131
 探测中性 TC 矢量介子的可能性 岳崇兴等 3 人 19(1995)1096
 现实的一代 ETC 模型对 $Zbb, Z\tau^+\tau^-$ 顶角的辐射修正 岳崇兴等 3 人 20(1996)997
 PG 玻色子 P_0^0 在 Tevatron 上的可能物理迹象 岳崇兴等 2 人 21(1997)311
- 岳瑞宏** 超对称系统的边界条件与可积性 岳瑞宏等 2 人 20(1996)514
岳学东 郑州 EAS 观测阵列的设计和初期运行 孙洛瑞等 4 人 17(1993)595

Z

- 曾高坚 李超代数 $B(0, 1)$ 的超相干态表示 匡乐满等 2 人 17(1993)215
- 曾晖 多丝室工作于自猝灭流光模式下定位特性的研究 陈宏芳等 5 人 17(1993)582
 气体雪崩放电的单光子测量时间谱 韩家祥等 5 人 20(1996)885
 闪烁光纤光传输特性的研究 汪晓莲等 7 人 21(1997)787
- 曾吉阳 确定 $\tau^+\tau^-\rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+\tau^-\rightarrow\pi^+\pi^-\pi^+\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
- 曾家刚 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 曾谨言 超形变核态研究的进展 17(1993)78
 Hg 和 Pb 超变形带的精确计算 雷奕安等 2 人 17(1993)636
 全同超形变带转动惯量的粒子数守恒计算 金太浩等 3 人 18(1994)239
 转动核对转移矩阵元与 Berry 相位 孟杰等 3 人 18(1994)249
 轴对称变形核中配对粒子态的构成 曾谨言等 3 人 19(1995)834
 全同多准粒子转动带的内部结构 雷奕安等 3 人 21(1997)227
 超变形转动带的自旋指定与实验测定的比较 雷奕安等 3 人 21(1997)648
- 曾祺 完全可积 $O(3)$ - σ 模型与 r, s 矩阵 李银万等 3 人 18(1994)518
- 曾文平 奇 $A^{117-125}\text{Cs}$ 核 $\pi h_{11/2}$ 带的研究 邢正等 5 人 20(1996)639
- 曾祥华 重离子碰撞中能量储藏同入射道动力学的关系 曾祥华等 3 人 18(1994)842
 在非相对论能量下介质中的核子-核子碰撞截面 葛凌霄等 2 人 19(1995)921
 中能区重离子碰撞中径向膨胀能量研究 曾祥华等 2 人 20(1996)345
 重离子碰撞中的热化、膨胀和径向流 曾祥华等 2 人 21(1997)157
- 曾祥欣 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 扎桑 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 扎西次仁 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 扎西桑珠 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 詹文龙 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 $46.7\text{MeV}/u$ $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 $46.7\text{MeV}/u$ ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
 $\text{CsI(Tl)} +$ 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481
 一个在 SPEG 磁谱仪上鉴别中能重离子反应中中重产物的分析方法 冯军等 6 人 17(1993)769

- 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
- 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au , ^{115}In , ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
- 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
- TR4终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
- 大动态范围二维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
- RIBLL1终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
- NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
- 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 战明川 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 章人杰 量子偶和量子偶对——量子代数 and 量子群的关系 吴 可等 3 人 17(1993)262
- 章世伟 JBD 直线宇宙弦的量子束缚态 章世伟等 2 人 17(1993)1016
- 张邦固 膨胀宇宙中孤立气团的运动 17(1993)803
- 张保国 $^{12}\text{C} + ^{209}\text{Bi}$ 中能对称三分裂实验研究 吴和宇等 10 人 17(1993)680
- 46.7MeV / A ^{12}C 轰击 ^{159}Tb , ^{197}Au 和 ^{209}Bi 的裂变测量及分析 罗清政等 11 人 18(1994)202
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中相对态布居与发射温度的提取 段利敏等 11 人 19(1995)393
- $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ (25MeV / u) 产生的热核激发能与核温度的关系 吴和宇等 11 人 19(1995)591
- 两体衰变径迹 文万信等 11 人 19(1995)598
- 激发能升高级联裂变到瞬发多重碎裂的演化 吴和宇等 10 人 19(1995)739
- 中能区 $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的发射时间测量 贺智勇等 11 人 20(1996)8
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应中轻粒子的在平面和出平面发射 贺智勇等 10 人 20(1996)394
- 中等质量热核三重碎裂 戴光曦等 7 人 20(1996)588
- 热核衰变中轻粒子的发射时间 贺智勇等 10 人 20(1996)596
- 热核四重碎裂研究 戴光曦等 9 人 20(1996)870
- 张炳云 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J / ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J / ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J / \psi$ 道测量 J / ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi / \eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J / $\psi \rightarrow \gamma\pi^0$, $\gamma\eta$, $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J / ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张彩娣 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 张长春 J / ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97

- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 J/ψ $\rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张长华 轻核结构 (I) Li 同位素核的结构性质 顾金南等 3 人 20(1996)185
轻丰中子核的壳模型计算 张长华等 2 人 20(1996)240
 $A = 147-153$ 核的 Gamow-Teller 跃迁 张长华等 2 人 20(1996)745
 ^{11}Be 的结构 张长华等 2 人 21(1997)260
铅区核的结构 (I) $^{207-210}\text{Tl}, ^{207,208}\text{Hg}$ 的能谱和波函数 张长华等 2 人 21(1997)734
铅区核的结构 (II) $^{208}\text{Tl}, ^{208}\text{Pb}$ 和 $^{206-208}\text{Hg}$ 的一级禁戒 β 衰变 张长华等 2 人 21(1997)812
- 张 闯 北京正负电子对撞机束团拉伸效应研究 国智元等 3 人 20(1996)1034
- 张春生 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
小样本时皮尔森 χ^2 量概率分布的讨论 吴 枚等 4 人 18(1994)879
怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线‘膝’区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 张春燕 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 张 纯 $25\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{nat}\text{Ag}, ^{209}\text{Bi}$ 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张 立等 8 人 21(1997)891
- 张达华 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89

- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- 北京 τ -c工厂(BTCF)快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 张大立 Xe 偶-偶同位素低激发态性质的 IBM2 描述 张大立等 3 人 18(1994)1130
- 张德红 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张德兴 双参数变形量子代数 $SU(1, 2)_{q,s}$ 的 Nodvik 实现和 Holstein-Primakoff 实现 于肇贤等 4 人 20(1996)1082
- 双参数变形多模玻色算符的代数结构及其应用(I) 于肇贤等 4 人 21(1997)999
- 张东海 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特性 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 张丰收 费米能区重离子碰撞动力学(III)碎裂与极限激发能 左 维等 3 人 17(1993)644
- 20—46MeV / u ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
- 原子核多重碎裂的静态理论 I. 相变和多重碎裂 张丰收等 2 人 21(1997)340
- 原子核多重碎裂的静态理论 II. 间歇类型和临界行为 张丰收等 2 人 21(1997)445
- 高能质子发射和冷原子核多重碎裂类型 张丰收等 3 人 21(1997)523
- 中能重离子反应中“neck”的形成和碎裂 陈列文等 3 人 21(1997)1018
- 张 戈 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 张焕乔 84.0MeV ^{16}O 轰击 ^{238}U 核的裂变碎片角关联的测量 钱 兴等 7 人 17(1993)173
- $^{16}\text{O} + ^{nat}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
- 垒下 $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 裂变碎片角关联模拟 钱 兴等 6 人 18(1994)385
- $^{16}\text{O} + ^{232}\text{Th}$ 垒下全熔合裂变 刘祖华等 7 人 18(1994)489
- 垒下熔合裂变中观察到的异常 刘祖华等 7 人 19(1995)585
- 预平衡裂变 刘祖华等 6 人 20(1996)107
- 用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
- $^{19}\text{F} + ^{208}\text{Pb}$ 近垒及垒下准弹反应 林承键等 6 人 21(1997)872
- 张慧敏 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 空气簇射切伦科夫光强横向分布测量 李延国等 7 人 17(1993)1070
- 甚高能区宇宙线流强气象效应的分析 贾焕玉等 3 人 18(1994)788
- 怀柔 EAS 阵列对初级宇宙线“膝”区能谱的测定 罗光宣等 9 人 19(1995)769
- 怀柔 EAS 阵列的 Monte Carlo 研究 罗光宣等 9 人 19(1995)884
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 张会领 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385

- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张吉龙** $e^+ + e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow V + X, X \rightarrow 3P$ 过程的角度分布螺旋度形式 张吉龙等 3 人 18(1994)43
 10TeV宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 张家驹** 一个膨胀的热核物质的双轻子谱 贺泽君等 3 人 17(1993)731
 强子的内部激发和 QCD 真空在核物质的热力学行为上的效应 贺泽君等 4 人 17(1993)1126
 膨胀的热核物质的富重子夸克——胶子物质的双轻子产生的抑制 贺泽君等 3 人 19(1995)165
 中心快度区的双轻子不变质量分布 贺泽君等 3 人 19(1995)1036
- 张家文** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张 建** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 关于 $\psi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张剑波 集团蒙特卡罗方法对一维量子 X-Y 模型的研究 季达人等 4 人 19(1995)42
- 张建华 夸克势模型中的重子-重子相互作用自旋-轨道耦合势 齐利杰等 4 人 18(1994)757
- N-N 相互作用中自旋轨道耦合力的夸克模型 张建华等 5 人 19(1995)87
- 张建玮 维数正规化和 NJL 模型 π 介子性质 张建玮等 4 人 18(1994)821
- 张 杰 400GeV/c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
- 400GeV/c pp 碰撞赙快度间隔长度分布 王韶舜等 8 人 17(1993)396
- 400GeV/c pp 碰撞赙快度空间带电粒子数密度的研究 王韶舜等 6 人 18(1994)392
- 400GeV/c pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
- 400GeV/c pp 碰撞多粒子产生的分形行为 王韶舜等 6 人 18(1994)975
- 400GeV/c pp 碰撞中的多粒子关联、阶乘累积矩和关联积分 王韶舜等 5 人 19(1995)296
- 400GeV/c pp 碰撞赙快度分布涨落的分形分析 王韶舜等 6 人 19(1995)968
- 400GeV/c pp 碰撞产生粒子的方位角结构 王韶舜等 6 人 20(1996)297
- 阶乘累积矩与阶乘矩之比随相空间大小的变化 王韶舜等 4 人 20(1996)783
- 400GeV/c pp 碰撞连续阶数阶乘矩和多重分形分析 王韶舜等 4 人 21(1997)769
- 400GeV/c pp 碰撞两粒子关联的角度依赖性 王韶舜等 3 人 21(1997)990
- 张金霞 用于垒下重离子熔合裂变研究的两维位置灵敏探测器 谭继廉等 7 人 21(1997)8
- 张锦龙 北京 τ -c 工厂 (BTCF) 快速蒙特卡罗模拟方法的开发和应用 黄因智等 13 人 21(1997)686
- 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 张敬业 碘与铯同位素高自旋带结构的区别 17(1993)734
- 核运动中的某些集体观察量 18(1994)1119
- 张竞上 核反应中的核结构效应 张竞上等 4 人 17(1993)745
- 张菊萍 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
- 对称裂变中惯性张量的计算 张学谦等 5 人 21(1997)58
- BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
- 张 军 $U_q(sl_2)$ 的两维循环表示和八顶角 Ising 模型 张 军等 3 人 19(1995)1005
- $U_q(sl(2))$ 的二维循环表示, C-G 系数和一个自由费米子八顶角模型 张 军等 3 人 19(1995)1084
- 编织假设与杨-Baxter 方程的解 张 军等 3 人 21(1997)714
- 张 坤 快中子在 Li 核上的弹性散射微分截面 张 坤等 5 人 19(1995)879
- 张兰宽 ^{128}Ce 16^+ 转晕态的寿命测量 李广生等 8 人 19(1995)1057
- 张黎文 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 张 立 47MeV/u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
- ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
- $4\pi\Delta E_{\beta}$ 探测器的建立及其在丰中子核素研究中的应用 王积成等 5 人 19(1995)653
- 28MeV/u ^{18}O 与全阻止厚天然铅靶反应中丰中子汞同位素的截面测量 王积成等 5 人 19(1995)686

- 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
 元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张立等 8 人 21(1997)891
- 张 力 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 银河宇宙线核传播的蒙特卡罗模拟 张 力等 4 人 17(1993)589
 中等银纬区逆康普顿 γ 射线强度 19(1995)974
 太阳耀斑与太阳高能粒子 张 力等 3 人 20(1996)877
- 张良生 J/ ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 J/ $\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张 霖 $e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-$, $\tau^- \rightarrow a_1^- \nu_{\tau}$, $a_1^- \rightarrow \rho\pi$ 过程的角分布和 a_1 介子的性质 郁 宏等 3 人 18(1994)583
 J/ ψ 三级二体衰变过程中产生的玻色共振态的研究 沈齐兴等 3 人 19(1995)16
 过程 $e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow V + X(J^{PC})$, $X \rightarrow 3P$ 的矩分析 张 霖等 3 人 19(1995)800
 对过程 $e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow \gamma + X(J^{PC})$, $X \rightarrow B\bar{B}$ (重子, 反重子)的角分布和共振态 X 的自旋-宇称分析 张 霖等 3 人 20(1996)280
 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 J/ $\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张令刚 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 张 鸣 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 银河宇宙线核传播的蒙特卡罗模拟 张 力等 4 人 17(1993)589
- 张乃健 超高能核作用中的晕事例 任敬儒等 7 人 20(1996)400
 高能强子在铁中的衰减 任敬儒等 9 人 20(1996)405
 大天顶角的多核心簇射 任敬儒等 7 人 21(1997)116

- 张泮林 高效率 Be 过滤探测器中子非弹性散射谱仪 阮景辉等 14 人 20(1996)498
- 张勤俭 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张庆营 关于 $s\bar{d}$ IBM 中自洽 Q 框架的高阶效应 王保林等 3 人 17(1993)1048
 三玻色子核的核谱研究 张庆营等 4 人 18(1994)353
 $1/N$ 展开技术的一些应用 张庆营等 4 人 20(1996)252
- 张少强 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + \pi\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张劭光 中能重离子碰撞动力学研究 刘建业等 2 人 19(1995)53
 用改进的量子分子动力学研究中能重离子碰撞中多重碎裂 刘 航等 4 人 19(1995)1040
- 张 寿 Skyrme 模型中新的附加质量项对重子及其共振态的影响 林进虎等 3 人 17(1993)38
- 张书明 氮喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068
- 张天保 用高纯锗 γ -谱仪借助滑动比较方法精密测量放射性核的 γ -射线能量 张天保等 5 人
 17(1993)202
 HgCdTe 中特征正电子湮没寿命值的确定 何元金等 3 人 18(1994)752
 仲态电子偶素湮没辐射能量的改进测量 彭良强等 5 人 19(1995)987
- 张天爵 CYCLAE 型回旋加速器负离子剥离引出的光学行为研究 肖美琴等 3 人 20(1996)1110
- 张天梅 50MeV / u ^{12}C 离子实验靶区出射中子角分布实验测量 李桂生等 6 人 17(1993)499
 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
 实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
 首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(\text{EC} + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)285
 合成和研究滴线区新核素 β 延发质子先驱核 ^{121}Ce 谢元祥等 8 人 21(1997)668
- 张万生 RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
 NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 张 伟 氮喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068

- 张伟丰 η_c -核束缚态 姜焕清等 2 人 17(1993)1021
- 张伟刚 相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511
2.1A GeV Ne + NaF 碰撞中的粒子群关联与集体性 21(1997)911
- 张卫宁 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
 π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630
多粒子玻色关联对夸克胶子等离子体颗粒源的检测 张卫宁等 4 人 19(1995)148
高能重离子碰撞中末态粒子的极角分布 霍 雷等 6 人 20(1996)311
多 π 关联对 π 发射源相干性的分析 张卫宁等 5 人 20(1996)707
高能重离子碰撞中末态粒子分布的非对称性 霍 雷等 5 人 20(1995)812
夸克的半经典输运方程 陈相君等 3 人 21(1997)905
- 张 汶 ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 张 翔 600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
400MeV/u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
6.3—24.6MeV/u $^{40}\text{Ar} + ^{186}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张 翔等 9 人 20(1996)21
- 张晓东 中高能重离子碰撞中的阵发混沌 葛凌霄等 3 人 18(1994)428
重离子碰撞中的同位旋效应 朱全伶等 3 人 18(1994)853
中能重离子碰撞中的涨落和中间质量碎片发射的机制 张晓东等 2 人 19(1995)945
QMD模型对 ^{11}Li 引起反应的研究 张晓东等 2 人 20(1996)270
重离子反应中核子前平衡发射的同位旋效应 陈列文等 3 人 20(1996)1091
- 张晓飞 快度中心区强子物质输运系数和粘滞流体演化 张晓飞等 2 人 18(1994)172
超越阿贝尔优势近似和色等离子体的输运系数计算 张晓飞等 2 人 18(1994)1043
 ρ - ω 混合和介质中的中子-质子质量差 刘 波等 4 人 21(1997)953
- 张孝泽 带权重的分布及其间歇性 陆中道等 4 人 17(1993)949
几率分布指数率与间歇现象 张孝泽等 6 人 18(1994)160
再散射输运模型与 K^+/π^+ 比的系统学 王仲奇等 6 人 18(1994)567
相对论性核碰撞中 K^+/π^+ 增强的输运模型解释 王仲奇等 6 人 18(1994)741
AGS能量下核系统的强阻止性 宋 光等 6 人 19(1995)172
弹剩余核衰变模式间竞争及其在 ALADIN 数据中的呈现 王 飞等 4 人 20(1996)729
非完全熔合碎裂模型与核液气相变 王 辉等 4 人 21(1997)44
- 张新明 双参数形变谐振子湮没算符二次幂的本征态 周焕强等 3 人 19(1995)251
偶偶核基带的量子群 $U_q(u_2)$ 模型的理论分析 张新明等 2 人 20(1996)165
- 张秀凤 硅微条探测器的研制 毛裕芳等 3 人 17(1993)784
- 张学谦 400GeV/c pp 碰撞前后多重数关联 王韶舜等 9 人 17(1993)1
用单能 γ 射线源校刻 β 塑料闪烁体能谱仪 潘强岩等 4 人 17(1993)391
新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
实验测定 ^{183}Os 的 Q_{EC} 值 徐树威等 8 人 17(1993)985
首次测定短寿命缺中子同位素 ^{153}Er 和 ^{157}Yb 的 EC/β^+ 衰变纲图 徐树威等 15 人 19(1995)193
新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
 ^{175}Er 的衰变纲图 张学谦等 9 人 20(1996)673
关于奇 A Tm 核 $1/2^+[411]$ 转动带的系统分析 钟纪泉等 2 人 20(1996)1087

- 对称裂变中惯性张量的计算 张学谦等 5 人 21(1997)58
- 偶-偶 Er 同位素核的 γ 自由度效应 钟纪泉等 2 人 21(1997)176
- 内转换效应在稀土区丰中子新核素鉴别中的应用 张学谦等 8 人 21(1997)201
- ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
- 张学尧** J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张雪珍** ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 张炎勋** $p\text{-}^3\text{He}$ 弹性散射动量空间库仑作用的研究 宋桂莲等 4 人 17(1993)763
- 张 阳** 单粒子半单举快度分布的 Cluster 效应 张 阳等 2 人 17(1993)822
- 高能 $p\bar{p}$ 碰撞末态粒子的结团产生和前后关联 张 阳等 2 人 18(1994)326
- 高能碰撞多粒子末态间歇现象与关联积分的研究 张 阳等 5 人 18(1994)621
- α 模型的改进和 Levy 指数的解析计算 林 海等 3 人 18(1994)858
- 高能碰撞二维相空间自仿射分形的解析研究 林 海等 3 人 20(1996)65
- 随机级联模型的连续标度行为 张 阳等 3 人 20(1996)715
- 高能碰撞中动力学起伏的横动量守恒约束 张 阳等 3 人 21(1997)130
- 张义民** 一代 Technicolor 模型对稀有衰变 $t \rightarrow cV$ 的贡献 王学雷等 4 人 19(1995)534
- 张英平** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 张勇和** 高能碰撞多粒子末态间歇现象与关联积分的研究 张 阳等 5 人 18(1994)621
- 张禹顺** 低能反质子的核散射与 Glauber 理论 李扬国等 2 人 19(1995)348
- 张 羽** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张玉虎** ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
- 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
- $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289

- 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
- $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢俊等 12 人 21(1997)15
- ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
- ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
- 耗散反应产物的电荷扩散与能量相干 卢俊等 6 人 21(1997)825
- ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘忠等 14 人 21(1997)881
- HIFRL首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 张玉珍 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
- 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 张月元 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^- \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$)衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 张肇西 利用具有两个 Higgs-doublets 的扩展标准模型对 LEP II 能量下 $t\bar{t}$ 产生过程的研究 张肇西等 4 人 17(1993)1081
- 在 LEP II 及 NLC 能量下 $e^+e^- \rightarrow b\bar{b}Z^0$ 和 $t\bar{t}Z^0$ 过程中 Higgs 粒子的观测效应 丁亦兵等 5 人 20(1996)982
- 张志杰 同步辐射小角散射实验站 董宝中等 4 人 19(1995)284
- 张竹湘 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 张子平 神经网络在 $\tau \rightarrow \rho\nu_\tau$ 极化分析中的应用 张子平等 3 人 18(1994)769
- 北京谱仪上的 e/π 分辨与相对似然法 叶树伟等 14 人 19(1995)1072
- 在 BES 实验中用神经网络法鉴别 e, μ, π 张子平等 4 人 21(1997)297
- 张宗焯 色屏蔽效应与核子-核子相互作用 沈肖雁等 4 人 17(1993)816
- 用夸克集团模型推导的 $S = -1$ 的 NY 系统的等效定域势 沈彭年等 4 人 17(1993)941
- $b\bar{b}$ 体系中的色屏蔽效应 董宇兵等 4 人 18(1994)547
- 夸克势模型中的重子-重子相互作用自旋-轨道耦合势 齐利杰等 4 人 18(1994)757
- $N-N$ 相互作用中自旋轨道耦合力的夸克模型 张建华等 5 人 19(1995)87
- 夸克-夸克等效相互作用与手征对称性 余友文等 4 人 19(1995)431
- $SU(3)$ 模型中夸克与手征场的相互作用 张宗焯等 3 人 20(1996)363
- 非奇异重子谱的非微扰效应 陈洪等 2 人 20(1996)937

- 张丰照 ^{20}Na β 延迟 α 衰变研究的新结果 徐晓冀等 10 人 18(1994)680
- 赵春华 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 赵春农 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
北京自由电子激光 Wiggler 中电子轨迹偏离的改进 黄 敏等 5 人 18(1994)1137
- 赵棟新 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
北京谱仪触发效率的测量 郁忠强等 7 人 19(1995)1062
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 赵恩广 一个简单的 K^+N 二体势 宁平治等 3 人 17(1993)152
转动核对转移短阵元与 Berry 相位 孟 杰等 3 人 18(1994)249
在量子分子动力学模型中与 N, Z 有关的宏观势对碎片形成的影响 李君清等 4 人 18(1994)379
核内 Δ 吸收截面 茅广军等 4 人 20(1996)1053
全同多准粒子转动带的内部结构 雷奕安等 3 人 21(1997)227
重原子核中单粒子的最邻近能级间距和能级曲率分布 顾建中等 4 人 21(1997)535
- 赵广义 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 赵国权 RPA 的复数本征解与相变 姚玉洁等 4 人 17(1993)757
Hartree-Fock 解多重性的研究 井孝功等 5 人 17(1993)1026
- 赵海文 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 赵红卫 ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 赵籍九 北京正负电子对撞机控制系统的改造升级 赵籍九等 13 人 20(1996)756
- 赵家伟 在 BES 实验中用神经网络法鉴别 e, μ, π 张子平等 4 人 21(1997)297

- 赵进华 ^{208}Hg 鉴别 张立等 12 人 18(1994)296
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
 $4\pi\Delta E_{\beta}$ 探测器的建立及其在丰中子核素研究中的应用 王积成等 5 人 19(1995)653
 $28\text{MeV}/u$ ^{18}O 与全阻止厚天然铅靶反应中丰中子汞同位素的截面测量 王积成等 5 人 19(1995)686
 元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张立等 8 人 21(1997)891
- 赵京伟 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 赵葵 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢俊等 12 人 21(1997)15
- 赵莉莉 $42\text{MeV}/u$ ^{12}C 与 ^{115}In 相互作用的靶余核 尹新民等 7 人 17(1993)979
 $^{16}\text{O} + ^{115}\text{In}$ 反应的全熔合与非完全熔合 李文新等 5 人 18(1994)481
 新重丰中子同位素 ^{239}Pa 杨维凡等 15 人 19(1995)479
 $135\text{MeV}/u$ ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦芝等 11 人 19(1995)481
 $20-46\text{MeV}/u$ ^{12}C 离子和 Cu 相互作用中靶余核的反冲性质研究 吴定清等 11 人 20(1996)13
 $6.3-24.6\text{MeV}/u$ $^{40}\text{Ar} + ^{186}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张翔等 9 人 20(1996)21
 600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
- 赵利敏 同步辐射微束 X 射线荧光分析实验站 吴应荣等 8 人 21(1997)475
- 赵柳 WZNW 模型的共形约化, 扩展的手征代数及相应的 Toda 类可积模型(I)一般构架 侯伯宇等 2 人 17(1993)28
 WZNW 模型的共形约化, 扩展的手征代数及相应的 Toda 类可积模型(II)一个例子 侯伯宇等 2 人 17(1993)241
 WZNW 模型的不同约化相应的 W 代数的联系 侯伯宇等 2 人 17(1993)329
 玻色超共形 Toda 模型与 Dressing 变换 赵柳等 2 人 17(1993)338
 从可积条件到共形对称: 玻色超共形 Toda 模型 17(1993)431
 超对称自对偶杨-Mills 模型 18(1994)20
 超对称自对偶杨-Mills 模型的 Hamilton 约化 18(1994)119
 $SU(2)$ Thirring 模型边界算子的 Boson 表达式 王延申等 5 人 20(1996)216
 含反射边界条件与广义统计的谐振子代数 21(1997)25
 中心扩张的 sl_2 双重 Yangian 的 Miura 变换 丁祥茂等 3 人 21(1997)697

- 赵 萌 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 赵佩英 在 e^+e^- 对撞过程中 τ 轻子对产生的阈行为 吴济民等 2 人 17(1993)379
2维 $O(3)$ 非线性 σ 模型的解析研究 19(1995)143
用独立元格等效作用量研究三维 $U(1)$ 格点规范理论的相结构 赵佩英等 2 人 20(1996)124
- 赵平德 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 赵 强 极端相对论性重离子碰撞横能分布的 Glauber 理论 王正行等 3 人 20(1996)234
- 赵庆中 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 赵书俊 郑州 EAS 观测阵列的设计和初期运行 孙洛瑞等 4 人 17(1993)595
- 赵树松 Fermi-Dirac 关联与 $Q^{-1}K_\nu(Q)$ 分布 戴启润等 4 人 20(1996)1014
- 赵维勤 相对论重离子碰撞中有限碰撞时间对能量密度的影响 赵维勤等 2 人 17(1993)476
胶子遮蔽和末态作用对 p -A 碰撞中粲偶素和 b 夸克偶素产额压低的贡献 刘 波等 2 人 18(1994)443
相对论重离子碰撞中 J/ψ 吸收截面的分析 刘 波等 2 人 18(1994)652

- 高能 p-A 碰撞中横能量分布的几何模型分析 刘波等 2 人 18(1994)1096
- 相对论重离子碰撞中粲偶素产额的横能依赖关系 赵维勤等 2 人 19(1995)49
- 高能 p-A 碰撞中领头粒子快度分布的几何效应和碎裂效应 刘庆军等 2 人 19(1995)340
- QGP 中的热胶子质量和 J/ψ 、 ψ' 的分解 高嵩等 3 人 21(1997)322
- 赵维仁** J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho \pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K \bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma \pi^0$ 、 $\gamma \eta$ 、 $\gamma \eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 赵文衡** J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 赵小键** 闪烁体瓦片/光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 赵新桥** 用于 BFEL 的多腔热阴极微波电子枪的设计研究 唐传祥等 7 人 21(1997)378
- 多腔热阴极微波电子枪的实验研究 唐传祥等 6 人 21(1997)470
- 赵昕** J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 赵彦森** 50 MeV/u ^{12}C 离子实验靶区出射中子角分布实验测量 李桂生等 6 人 17(1993)499
- 赵有雄** 46.7 MeV/u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
- 46.7 MeV/u $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
- 46.7 MeV/u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
- 46.7 MeV/u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
- 46.7 MeV/u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
- 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
- TR4 终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
- 大动态范围二维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
- RIBLL1 终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
- 赵玉民** 有效玻色子数及其应用 赵玉民等 2 人 18(1994)68
- IBM-2 有效玻色子数和它在系数学中的应用 赵玉民等 2 人 19(1995)548
- 关于“不可约性假设的证明及其应用”一文的评注 赵玉民等 2 人 21(1997)121
- 原子核的配对壳模型及数值计算 (I) 赵玉民等 3 人 21(1997)356
- 原子核的配对壳模型数值计算 (II) 赵玉民等 2 人 21(1997)438
- 赵振堂** 混频 $1/2 + m$ 腔微波电子枪束流动力学特性 赵振堂等 3 人 18(1994)664

- 赵正姬 全同超形变带转动惯量的粒子数守恒计算 金太浩等 3 人 18(1994)239
- 赵政国 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 赵之正 47MeV / u ^{12}C 同 ^{133}Cs 反应碘同位素产额的测定 杨维凡等 10 人 17(1993)873
- 新重丰中子核 ^{237}Th 的合成和鉴别 袁双贵等 12 人 17(1993)959
- 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
- ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
- 氙喷嘴激光离子源离线系统的实验结果 徐四大等 7 人 19(1995)1068
- 中能 $^{12}\text{C} + ^{197}\text{Au}$ 产物中 Ir 的同位素分布观测 赵之正等 13 人 21(1997)402
- 新丰中子同位素 ^{186}Hf 杨维凡等 18 人 21(1997)958
- 郑春开 原子核振动与转动模型 (I) 推转玻尔-莫特逊哈密顿量和偶偶核正常转动谱分析 胡济民等 3 人 20(1996)76
- 原子核的振动与转动模型 (II) 奇 A 核正常转动谱分析 胡济民等 3 人 20(1996)259
- 应用原子核的宏观-微观模型研究远离稳定线核的性质 郑春开等 3 人 20(1996)317
- 原子核的振动与转动模型 (III) A~190 区超形变带研究 许甫荣等 3 人 20(1996)554
- 郑国桐 有限温度下赝标耦合中的 η 介子 高守恩等 4 人 18(1994)148
- 有限温度单 ρ 介子交换势 郑国桐等 2 人 18(1994)525
- 郑 华 高自旋态下 ^{160}Lu 能级自旋的确定 孙慧斌等 6 人 19(1995)929
- ^{171}Lu $1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 郑纪文 $^{16}\text{O} + ^{nat}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
- ^{208}Hg 鉴别 张 立等 12 人 18(1994)296
- 600MeV $^{40}\text{Ar} + ^{197}\text{Au}$ 反应碎片角分布 刘国兴等 11 人 19(1995)305
- 28MeV / u ^{18}O 与全阻止厚天然铅靶反应中丰中子汞同位素的截面测量 王积成等 5 人 19(1995)686
- 6.3—24.6MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{nat}\text{W}$ 反应中 Hf 的生成研究 张 翔等 9 人 20(1996)21
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中等质量碎片的热核蒸发 钱 兴等 15 人 20(1996)304
- 25MeV / u $^{40}\text{Ar} + ^{nat}\text{Ag}, ^{209}\text{Bi}$ 反应中热核的温度和激发能测量 尹淑芝等 14 人 21(1997)680
- 元素分离样品中丰中子同位素弱 γ 活性探测 张 立等 8 人 21(1997)891
- 郑建平 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385

- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 郑林生 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- τ轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- ψ(2S)的τ轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- ψ(2S) → ρπ 及 ψ(2S) → $K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- ψ(2S)强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双μ产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 J/ψ → $\gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 郑敏 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 郑平子 $^{16}\text{O} + ^{208}\text{S}$ 全熔合激发函数 王素芳等 12 人 18(1994)6
- 郑蒲英 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 郑仁善 Hf 高自旋态推转壳模型 PNC 方法研究 林辛未等 3 人 19(1995)359
- A = 160 号区部分奇奇核的晕带能谱计算 朱顺泉等 4 人 20(1996)455
- 郑泰玉 有限温度下的 Casimir 效应 19(1995)241
- 二维情况下内部有质量费米子单圈图对 Casimir 力的贡献 郑泰玉等 2 人 20(1996)211
- 郑文莉 三角形弯晶单色器的分光及聚焦特性研究 郑文莉等 5 人 19(1995)858
- 北京同步辐射装置 X 射线漫散射实验站及准周期非晶多层膜的 X 射线非镜面散射研究 姜晓明等 6 人 20(1996)460
- 郑文生 J/ψ强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 郑希特 有限温度格点 U(1)规范理论计算 郑希特等 2 人 17(1993)134
- 有限温度 U(1)格点规范模型的高阶累积展开之研究 郑希特等 4 人 17(1993)1076
- 格点定模 SU(2)-Higgs 模型的解析计算 郑希特等 4 人 19(1995)137
- 格点变模 SU(2)-Higgs 模型的解析计算 刘备书等 2 人 19(1995)1090
- 郑玉明 带权重的分布及其间歇性 陆中道等 4 人 17(1993)949
- 几率分布指数率与间歇现象 张孝泽等 6 人 18(1994)160
- 再散射输运模型与 K^+/π^+ 比的系统学 王仲奇等 6 人 18(1994)567
- 相对论性核碰撞中 K^+/π^+ 增强的输运模型解释 王仲奇等 6 人 18(1994)741
- AGS 能量下核系统的强阻止性 宋光等 6 人 19(1995)172
- 重离子碰撞中产生的 K 介子末态作用 储自力等 4 人 19(1995)365
- 重离子碰撞中 K 介子和 π 介子产生的统一动力学模拟 储自力等 5 人 20(1996)438
- 熔合碎裂模型和 ALADIN 多重碎裂数据 王飞等 4 人 20(1996)644

- 弹剩余核衰变模式间竞争及其在 ALADIN 数据中的呈现 王 飞等 4 人 20(1996)729
- 非完全熔合碎裂模型与核液气相变 王 辉等 4 人 21(1997)44
- 郑哲洙 Skyrme 模型中新的附加质量项对重子及其共振态的影响 林进虎等 3 人 17(1993)38
- 郑志鹏 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- J/ψ 强衰变产生的 $\theta(1720)$ 宽共振峰的研究 郁 宏等 5 人 17(1993)601
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 钟纪泉 新重丰中子同位素 ^{175}Er 的合成和 γ 衰变 杨维凡等 11 人 19(1995)959
- 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- 双幻核 ^{100}Sn 的基态性质 文万信等 3 人 20(1996)148
- 超铀区缺中子新同位素 ^{235}Am 的合成与鉴别 郭俊盛等 17 人 20(1996)286
- 单极巨共振弛豫过程 文万信等 3 人 20(1996)546
- 关于奇 A Tm 核 $1/2^+[411]$ 转动带的系统分析 钟纪泉等 2 人 20(1996)1087
- 偶-偶 Er 同位素核的 γ 自由度效应 钟纪泉等 2 人 21(1997)176
- ^{229}Ra 的衰变纲图 沈水法等 10 人 21(1997)783
- 钟万衡 有限温度和有限密度下的汤川势 钱志新等 3 人 17(1993)417
- 钟学初 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 钟 宇 $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞质快度空间带电粒子数密度的研究 王韶舜等 6 人 18(1994)392
- $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞间歇指数的测量 王韶舜等 7 人 18(1994)970
- $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞多粒子产生的分形行为 王韶舜等 6 人 18(1994)975
- $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞中的多粒子关联、阶乘累积矩和关联积分 王韶舜等 5 人 19(1995)296
- $400\text{GeV}/c$ pp 碰撞质快度分布涨落的分形分析 王韶舜等 6 人 19(1995)968
- 钟元元 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
- 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
- 钟云霄 用变分法解 Fokker-Planck 方程计算核裂变几率 钟云霄等 2 人 18(1994)340
- 多维 Kramers 公式的研究 钟云霄等 2 人 18(1994)949
- 重离子熔合反应的相互作用势 胡济民等 2 人 20(1996)932
- 仲崇昌 确定 $\tau^+ \tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变道事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 周宝庆 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673

- 周宝森 巨共振激发的相对论效应 周宝森等 3 人 19(1995)840
关于 $M-3Y$ 力等效 G 矩阵元在重核区的有效性 程 岚等 3 人 20(1996)246
- 周春梅 γ 跃迁多极混合比和内转换系数计算 17(1993)955
- 周代翠 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- 周光谱 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 周洪波 用相对论 VUU 研究平均场和核子-核子截面对高能和中能集体流的影响 周洪波等 3 人 19(1995)156
- 周化十 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
用小角度 Bhabha 事例谱形分析方法确定北京谱仪亮度 朱启明等 4 人 17(1993)1057
北京谱仪亮度监测器 Bhabha 散射截面的蒙特卡罗计算 朱永生等 4 人 18(1994)503
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 周焕强 双参数形变谐振子湮没算符二次幂的本征态 周焕强等 3 人 19(1995)251

- 关于双参数量子代数 $su_{q_s}(2)$ 和双参数形变谐振子的若干结果 周焕强等 3 人 19(1995)420
 具有 $U_{qp}(U_3) \supset U_{qp}(U_2) \supset U_{qp}(SO_2)$ 对称的双参数形变二维相互作用玻色子模型 周焕强等 3 人 20(1996)38
 偶偶核基带的量子群 $U_{qp}(u_2)$ 模型的理论分析 张新明等 2 人 20(1996)165
- 周剑歌 包含轻子结构的夸克模型 刘耀阳等 3 人 20(1996)900
- 周建群 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
 46.7MeV / u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 46.7MeV / u $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 46.7MeV / u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
 CsI(Tl) + 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481
 46.7MeV / u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
 46.7MeV / u ^{12}C 轰击 ^{197}Au 、 ^{115}In 、 ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
 过零时间法的实验模拟与理论分析 王金川等 9 人 19(1995)489
 TR4终端高性能探测器系统 郭忠言等 9 人 19(1995)865
 大动态范围二维位置灵敏多叠层探测系统 王金川等 8 人 20(1996)204
 RIBLL1终端实验装置 郭忠言等 11 人 20(1996)491
 NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
- 周 杰 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 周金礼 中能区质子与 ^4He 原子核散射的唯象全振幅 李清润等 2 人 17(1993)918
- 周景晨 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- 周 莉 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $i/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 BES 实验数据离线刻度 毛泽普等 22 人 20(1996)1073
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0$ 、 $\gamma\eta$ 、 $\gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 周全华 重离子深光势垒和宇称相关作用 高成群等 3 人 17(1993)665
 相同质量 $4N$ 核间的半微观光学势 周全华等 3 人 18(1994)460

- 质量相近 $4N$ 核间宇称相关势的折叠模型 周全华等 3 人 18(1994)1051
- $^{20}\text{Ne} + ^{12}\text{C}$ 系统与深光学势下的双 α 转移效应 高成群等 3 人 20(1996)159
- 周善贵 $^{171}\text{Lu} \ 1/2^- [541]$ 轨道的形变驱动作用 马英君等 11 人 20(1996)865
- 奇奇核 ^{162}Lu 晕转带及四准粒子带的能级结构 马英君等 8 人 21(1997)970
- 周嗣信 ECR 源的新工作模式 刘占稳等 10 人 20(1996)957
- 周慰因 利用加速器质谱计测量 ^{10}Be 形成截面 刘联璠等 6 人 19(1995)786
- 周文德 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- 寻找 10TeV 能区的 γ 射线暴 丁林恺等 21 人 21(1997)673
- 10TeV 宇宙线的太阳阴影与太阳活动的关联 刘绍敏等 25 人 21(1997)865
- 周先意 金属玻璃 $\text{Pd}_{79.5}\text{Ni}_4\text{Si}_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
- Al / GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
- 周咸建 $Z \rightarrow 3\gamma$ 和 $\gamma\gamma \rightarrow \gamma\gamma$ 极化张量的一般形式 江向东等 2 人 17(1993)898
- 荷电标量介子对光子与光子散射振幅贡献的精确解析表达式 杨茂志等 3 人 19(1995)727
- 周小帆 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow \bar{K}K^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\iota/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 周小红 在 ^{20}Na β 延迟 α 衰变中观察到的新衰变道 徐晓冀等 8 人 17(1993)577
- ^{117}Xe 核激发态的实验识别 刘 忠等 14 人 19(1995)106
- 缺中子核 ^{197}Bi 的能级结构研究 周小红等 13 人 19(1995)961
- ^{198}Bi 的高自旋态结构研究 周小红等 13 人 20(1996)769
- 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
- ^{162}Lu 的高自旋态及 $A=160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
- ^{117}Xe 负宇称同质异能态寿命测量 刘 忠等 14 人 21(1997)881
- HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 周 昕 相对论核-核碰撞中产生的 Λ 粒子的横向极化度与横向动量的关联 叶云秀等 5 人 20(1996)685
- 周永参 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 闪烁体瓦片 / 光纤量能器辐照损伤的进一步研究 毛慧顺等 12 人 18(1994)870
- 周月华 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385

- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 北京谱仪桶部簇射计数器能量响应特性研究 陈宏芳等 20 人 20(1996)1
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n=0,1,2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 周治宁 $A \sim 190$ 区超形变带的 $\Delta I = 4$ 分岔 吴崇试等 3 人 20(1996)1028
 周卓微 同位旋守恒对奇异性产生的约束 杨纯斌等 3 人 20(1996)991
 朱栋培 QED 中相互作用场的量子化 王仁川等 2 人 18(1994)1012
 朱福英 $FeCl^+$ 轰击 Ag 靶的溅射产额非线性增强效应 王震遐等 7 人 21(1997)304
 朱国怀 相对论核-核碰撞中产生的 Λ 粒子的横向极化度与横向动量的关联 叶云秀等 5 人 20(1996)685
 B^0 衰变中的 CP 不对称性的重新估算 20(1996)913
 朱国胜 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 朱国义 在低能 e^+e^- 湮没中寻找低质量中性粒子 何景棠等 4 人 18(1994)404
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 硅酸铋(BSO)晶体闪烁性能研究 何景棠等 11 人 21(1997)886
 朱鹤年 BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
 朱建阳 IBM 内禀基带、单声子激发带和双声子激发带的转动惯量及能谱 17(1993)851
 朱介鼎 在中能重离子反应中核子的运动特征 李君清等 4 人 20(1996)839
 朱晋生 金属玻璃 $Pd_{79.5}Ni_4Si_{16.5}$ 结晶化过程的慢正电子束研究 韩荣典等 8 人 17(1993)300
 Al / GaAs 界面微结构的慢正电子束研究 翁惠民等 7 人 17(1993)775
 朱连芳 Moyer 模式在高能重离子加速器辐射保护屏蔽设计中的应用 朱连芳等 4 人 20(1996)858
 朱明礼 微条气体室的研制 郁忠强等 5 人 20(1996)678
 微间隙室的研制 郁忠强等 5 人 21(1997)494
 朱 萍 相对论微观光学势中相互作用力程的效应 朱 萍等 3 人 17(1993)549
 朱启明 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 用小角度Bhabha事例谱形分析方法确定北京谱仪亮度 朱启明等 4 人 17(1993)1057
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 τ 质量测量方案的 Monte Carlo 研究 李 金等 11 人 19(1995)209
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
- J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
- 朱清棋 从高山乳胶室事例研究强相互作用在碎裂区的特征 陈江川等 4 人 19(1995)494
- 朱全伶 25 MeV / A $^{20}\text{Ne} + ^{20}\text{Ne}$ 周边碰撞 朱全伶等 2 人 17(1993)658
- 在量子分子动力学模型中与 N, Z 有关的宏观势对碎片形成的影响 李君清等 4 人 18(1994)379
- 中高能重离子碰撞中的阵发混沌 葛凌霄等 3 人 18(1994)428
- 重离子碰撞中的同位旋效应 朱全伶等 3 人 18(1994)853
- 朱善根 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 朱少飞 丰中子同位素 ^{189}W β^- 衰变的新 γ 线 杨维凡等 11 人 17(1993)1055
- Moyer 模式在重离子加速器辐射防护屏蔽设计中的应用 朱连芳等 4 人 20(1996)858
- 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
- 首次建立缺中子核素 ^{209}Fr 的分支比很弱的 $(EC + \beta^+)$ 衰变纲图 谢元祥等 12 人 21(1997)285
- HIFRL 首次在束 γ 实验 郭应祥等 10 人 21(1997)976
- 朱胜江 丰中子核素能级结构研究及 $A \sim 100$ 与 $A \sim 150$ 区丰中子核形状相变讨论 朱胜江等 2 人 17(1993)353
- ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- 丰中子核 $^{141}\text{Xe}, ^{152}\text{Ce}, ^{153}\text{Nd}$ 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- BEPC 束流极化与极化仪的研究 邓景康等 10 人 21(1997)562
- 朱顺泉 $A = 160$ 号区部分奇奇核的晕带能谱计算 朱顺泉等 4 人 20(1996)455
- 朱伟 Gottfried 求和规则中的价夸克混合效应 17(1993)714
- 朱亚波 统一描述 EMC 效应, 核 Drell-Yan 过程和 J/ψ 光生过程的一个简单模型 朱亚波等 2 人 21(1997)806
- 朱永生 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
- 北京谱仪亮度监测器 Bhabha 散射截面的蒙特卡罗计算 朱永生等 4 人 18(1994)503
- τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^\mp \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
- J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385

- J/ψ能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 北京谱仪端盖簇射计数器的能量分辨及其模拟研究 陈江川等 9 人 21(1997)982
- 朱志远 关于形变壳组态方法在过渡核及中重核的应用 朱志远等 2 人 17(1993)1120
 巨共振激发的相对论效应 周宝森等 3 人 19(1995)840
 推转相对论平均场方法中超形变核的全同带 朱志远等 3 人 20(1996)448
- 朱智勇 Ar 离子辐照非晶态合金引起的尺寸变化 刘昌龙等 10 人 21(1997)1052
- 诸永泰 谱仪放大器参数对脉冲形状分析法鉴别轻带电粒子的影响 王金川等 8 人 17(1993)69
 46.7MeV/u ^{12}C 引起的弹核碎裂反应 刘冠华等 12 人 17(1993)166
 46.7MeV/u $^{12}\text{C} + ^{58}\text{Ni}$ 反应中的轻带电粒子关联测量 郝鸿飞等 11 人 17(1993)268
 46.7MeV/u ^{12}C 引起的核反应中碎裂与转移的竞争 刘冠华等 12 人 17(1993)276
 46.7MeV/u ^{12}C 诱发核反应中非稳态产物的布居及核温度的提取 郝鸿飞等 11 人 17(1993)294
 CsI(Tl) + 光二极管读出探测器在中能重离子核反应实验中的应用 郝鸿飞等 7 人 17(1993)481
 一个在 SPEG 磁谱仪上鉴别中能重离子反应中中重产物的分析方法 冯 军等 6 人 17(1993)769
 46.7MeV/u ^{12}C 诱发核反应中的双质子干涉研究 郝鸿飞等 11 人 18(1994)102
 $^{19}\text{F} + ^{45}\text{Sc}$ 深非弹反应产物的激发函数 王 琦等 12 人 18(1994)398
 46.7MeV/u ^{12}C 轰击 ^{197}Au 、 ^{115}In 、 ^{58}Ni 靶时产生的复杂碎片 尹淑芝等 11 人 18(1994)673
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应同位素类弹碎片的截面涨落 王 琦等 12 人 20(1996)289
 $^{19}\text{F} + ^{51}\text{V}$ 耗散反应中能量相干宽度的角度相关性 卢 俊等 12 人 21(1997)15
 双奇核 ^{170}Ta 的转动带结构 张玉虎等 14 人 21(1997)187
 ^{162}Lu 的高自旋态及 $A = 160$ 区双奇核晕态能级的符号因子反转 张玉虎等 12 人 21(1997)393
 NE102A + CsI(Tl) + PMT 中能重离子探测器望远镜 祁 中等 11 人 21(1997)481
 用于中能重离子反应测量的塑料闪烁探测器阵列 祁 中等 11 人 21(1997)577
 中等质量碎片的内部激发对同位素核温度的影响 魏志勇等 2 人 21(1997)615
 中心集体流对带电粒子关联函数的影响 郝鸿飞等 4 人 21(1997)627
 100MeV/u Au + Au 对心碰撞中心集体流的发展 郝鸿飞等 5 人 21(1997)728
 耗散反应产物的电荷扩散与能量相干 卢 俊等 6 人 21(1997)825
- 祝红国 确定 $\tau^+\tau^- \rightarrow e\mu(\nu)$ 衰变道事例选择效率的一种半实验方法 叶树伟等 13 人 18(1994)577
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 祝玉灿 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 J/ψ 强衰变产生的 $\theta(1720)$ 宽共振峰的研究 郁 宏等 5 人 17(1993)601
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 ψ(2S) 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-\text{J}/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961

- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 庄保安 J/ψ 强衰变中 $f_2(1270)$ 性质的实验研究 白景芝等 151 人 17(1993)97
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 J/ψ 衰变中 $f_0(975)$ 的实验研究 白景芝等 149 人 19(1995)289
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm}\pi^-\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 $\psi(2S)$ 的 τ 轻子对衰变研究 白景芝等 137 人 19(1995)577
 J/ψ 共振参数的测定 白景芝等 151 人 19(1995)673
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 关于 $\chi/\eta(1440)$ 的结构分析 白景芝等 150 人 20(1996)961
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 大角度巴巴散射和双 μ 产生的研究与亮度测量 白景芝等 147 人 21(1997)97
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
 北京谱仪上 $J/\psi \rightarrow \gamma\pi^0, \gamma\eta, \gamma\eta' \rightarrow 3\gamma$ 衰变道的分支比测量 白景芝等 161 人 21(1997)385
 J/ψ 能区强子单举产生的实验研究 白景芝等 161 人 21(1997)961
 庄红林 小间隙高放大多丝室及其放电机理 王继华等 10 人 18(1994)107
 庄杰佳 北京自由电子激光装置的红外激光振荡实验 谢家麟等 14 人 18(1994)572
 北京自由电子激光最近进展——实现饱和振荡 谢家麟等 33 人 18(1994)763
 北京自由电子激光 Wiggler 中电子轨迹偏离的改进 黄敏等 5 人 18(1994)1137
 庄鹏飞 相对论重离子碰撞中的线性背景与非线性效应 庄鹏飞等 2 人 18(1994)143
 卓益忠 有限温度下多维裂变速率的量子修正 包景东等 3 人 17(1993)362
 温度相关的核子相对论微观光学势 韩银录等 3 人 17(1993)568
 四级交换图对相对论微观光学势的贡献 韩银录等 4 人 17(1993)751
 核裂变扩散模型 Kramers 定态解的理论分析 冯仁发等 3 人 18(1994)361
 相对论重离子反应的热化过程 李祝霞等 4 人 18(1994)559
 用相对论 VUU 研究平均场和核子-核子截面对高能和中能集体流的影响 周洪波等 3 人 19(1995)156
 核内核子-核子非弹散射截面(I) 茅广军等 4 人 19(1995)540
 核内核子-核子非弹散射截面(II) 茅广军等 4 人 19(1995)628
 Δ 粒子的相对论 BUU 方程 茅广军等 3 人 20(1996)826
 核内核子与 Δ 粒子的散射截面 茅广军等 3 人 20(1996)925
 核内 Δ 吸收截面 茅广军等 4 人 20(1996)1053
 重原子核中单粒子的最邻近能级间距和能级曲率分布 顾建中等 4 人 21(1997)535
 邹鹏程 “不可约性假设”的证明及应用 邹鹏程等 2 人 19(1995)796
 邹永清 $u\bar{u} \rightarrow s\bar{s}$ 过程的胶子交换势与 $p\bar{p} \rightarrow \Lambda\bar{\Lambda}$ 过程的反应截面 杨易等 4 人 18(1994)85
 沮栋林 RF 超导腔低温测量原理 沮栋林等 2 人 20(1996)663
 1.3GHz 新结构超导实用单胞腔物理设计 20(1996)1041

- 直线对撞机用的 FR 超导多胞加速腔和陷阱模研究 俎栋林等 2 人 21(1997)180
- 左 维 多体关联 Green 函数动力学 II. 截断近似 左 维等 2 人 17(1993)179
- 费米能区重离子碰撞动力学 III. 碎裂与极限激发能 左 维等 3 人 17(1993)644
- 多体关联格林函数动力学 IV. 相对论推广 左 维等 3 人 18(1994)616
- 重离子碰撞中能量储藏同入射道动力学的关系 曾祥华等 3 人 18(1994)842
- 重子碰撞两体关联输运理论 I. 理论模型: 相干态表象的构造与基本运动方程 刘建业等 5 人 20(1996)1007
- 重离子碰撞两体关联输运理论 III. 半经典近似下的数值计算 刘 航等 5 人 21(1997)169
- BES 合作组 $\psi(2S)$ 强衰变中的一个新的反常现象 19(1995)93

外 籍 作 者

A

- M. I. Adamovich 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- M. Adechi 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- M. M. Aggarwal 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- Y. A. Alexandrov 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- F. Ambe 135MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦 芝等 11 人 19(1995)481
- S. Ambe 135MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦 芝等 11 人 19(1995)481
- M. Amenomori 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- N. P. Andreeva 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884

- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- Z. V. Anson** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- N. Aoi** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- R. Arora** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- K. Asahi** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- F. A. Avetyan** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- B**
- B. R. S. Babu** 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- S. K. Badyal** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- V. Baran** 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- O. Bardon** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- E. S. Basova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- I. K. Bazarov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- K. B. Bhalla** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- A. Bhasin** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- V. S. Bhatia** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- R. Bimbot** 95MeV / u 的¹²C 炮弹产生的二次束流强度研究 杨永锋等 3 人 19(1995)
 980
- I. Blum** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau}$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
 193
- V. G. Bogdanov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- A. Breakstone** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- V. I. Bubnov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- T. Buennett** $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- T. H. Burnett** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- C**
- J. Campbell** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D. A. Carshiev** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- F. Carstoiu 晕核对 ^{11}Li , ^{14}Be 和 ^{17}B 的进一步研究 任中洲等 2 人 19(1995)562
- H. K. Carter ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- A. M. Ceitimbetov 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- S. J. Chae 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- I. Y. Chasnikov 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- J. Chen τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- L. P. Chernova 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- M. M. Chernyavski 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- S. Y. Chu 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
 π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725

- 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人
17(1993)912
- 相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511
- π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630
- J. D. Cole** 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- M. Colonna** 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- R. Cowan** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- R. F. Cowan** 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- P. C. N. Crouzen** 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
- 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982

D

- M. Di Tori** 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- W. Dunwoodie** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

E

- G. Z. Eligbaeva** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- L. E. Eremenko** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人

18(1994)884

BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

F

M. Fero

 τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

A. Ferragut

奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385

N. Fukunishi

丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778

Fumitoshi Ambe

40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991

S. Y. Fung

2 π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49 π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人 17(1993)912

多粒子玻色关联对夸克胶子等离子体颗粒源的检测 张卫宁等 6 人 18(1994)148

相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511

 π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630

高能重离子碰撞中末态粒子的极角分布 霍 雷等 6 人 20(1996)311

多 π 关联对 π 发射源相干性的分析 张卫宁等 5 人 20(1996)707

K. Furono

奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385

K. Furutaka

10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶 巍等 12 人 21(1997)1

Y. Futami

10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶 巍等 12 人 21(1997)1

G

A. S. Gaitinov

高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289

高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884

BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

E. Ganssauge

高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- S. Garpman** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- S. G. Gerassimov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- Yu. M. Gledenov** 入射能量为 5.1 MeV 中子⁵⁸Ni(n, α)⁵⁵Fe 反应截面和出射粒子角分布测量 唐国
 有等 6 人 19(1995)223
- Y. Gono** 奇-奇核¹⁴⁴Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人
 20(1996)385
¹⁴⁶Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- P. Gratton** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03 \text{ GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
 193
- J. Grote** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- A. Guarnera** 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- K. G. Gulamov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich

- 等 109 人 19(1995)703
- S. K. Gupta** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- V. K. Gupta** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- ### H
- K. Hagel** 对称多重裂变的形变位势垒及其对核温度的依赖性 戴光曦等 6 人 19(1995)447
- S. Hamata** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- J. H. Hamilton** ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- F. A. Harris** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- M. Hatanaka** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- T. Hayakawa** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385

- H. H. Heckman** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- K. Hibino** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- D. G. Hitlin** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- Y. Hori** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- N. Hotta** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385

I

- E. Ideguchi** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- H. Iimura** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- V. Innocente** 神经网络在 $\tau \rightarrow \rho\nu_{\tau}$ 极化分析中的应用 张子平等 3 人 18(1994)769
- M. Ishihara** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
 ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- M. Iwamoto** 135MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦 芝等 11 人 19(1995)481
- J. M. Izen** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- H. Izumi** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778

J

- B. Jakobsson** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- Q. P. Jia** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
 193
- J. Jiang** 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
 π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725
 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人
 17(1993)912
- L. Jones** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
 193
- B. Judek** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- L. Just** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703

K

- S. Kachroo** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- F. Kajino** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55
 人 17(1993)385
- G. S. Kalyachkina** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- E. K. Kanygina** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- H. Kaper** 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
- M. Karabova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
 等 109 人 19(1995)703
- J. Kasagi** 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶 巍等
 12 人 21(1997)1
- K. Kasahara** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55
 人 17(1993)385
- D. Keane** 2 π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
 π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725
 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人
 17(1993)912
 相对论重离子碰撞中集合流的横向运动关联 刘亦铭等 7 人 18(1994)511
 π 干涉学分析中的吸收关联 霍 雷等 7 人 18(1994)630
 多粒子玻色关联对夸克胶子等离子体颗粒源的检测 张卫宁等 6 人 19(1995)148
 高能重离子碰撞中末态粒子的极角分布 霍 雷等 6 人 20(1996)311
 多 π 关联对 π 发射源相干性的分析 张卫宁等 5 人 20(1996)707
 高能重离子碰撞中末态粒子分布的非对称性 霍 雷等 5 人 20(1996)812
- M. H. Kelsey** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人

- 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- Kenji Kumagai** 玻色-爱因斯坦关联半径和源半径对实验窗口的依赖及它们的差异 陆中道等 4 人 21(1997)458
- S. P. Kharamov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- G. Khuhenhuu** 入射能量为 5.1MeV 中子 $^{58}\text{Ni}(n, \alpha)^{55}\text{Fe}$ 反应截面和出射粒子角分布测量 唐国等有 6 人 19(1995)223
- B. K. Kim** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- J. C. Kim** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- T. Kishida** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- S. Kitroo** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- Y. Kobayashi** $^{135}\text{MeV/u } ^{12}\text{C}$ 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦芝等 11 人 19(1995)481
- E. E. Koldenhof** $^{294}\text{MeV } ^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
 $^{294}\text{MeV } ^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
- T. Komatsbara** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- D. Kong** D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193

- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- J. Konig** 推转相对论平均场方法中超形变核的全同带 朱志远等 3 人 20(1996)448
- M. O. Kortelahti** ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- B. Kotlinski** $294\text{MeV } ^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
 $294\text{MeV } ^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
- S. A. Krasnov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- S. Kulikova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- H. Kumagai** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- V. Kumar** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- H. Kusakari** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
 ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- L**
- P. Lal** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- A. Lankford** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人

- 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- V. G. Larionova 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- J. L. Laville 高能质子发射和冷原子核多重碎裂类型 张丰收等 3 人 21(1997)523
- I. Y. Lee 丰中子核素能级结构研究及 $A \sim 100$ 与 $A \sim 150$ 区丰中子核形状相变讨论 朱胜江等 2 人 17(1993)353
 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- S. M. Lee 10.6 MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶 巍等 12 人 21(1997)1
- H. K. W. Leegte 294 MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
 294 MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
- R. Lipton 硅微条探测器的辐射损伤试验 顾维新等 2 人 21(1997)292
- H. Liu 高能重离子碰撞中末态粒子分布的非对称性 霍 雷等 5 人 20(1996)812
- S. Lokanathan 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- U. Lombardo 核介质中核子-核子散射截面的 BHF 微观计算 蔡延瑛等 3 人 20(1996)945
- J. Lord 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- X. C. Lou τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-\text{J}/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
Y. N. Lou 对称多重裂变的形变位势垒及其对核温度的依赖性 戴光曦等 6 人 19(1995)447
B. Lowery τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
J. Lu 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
N. S. Lukicheva 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

M

W. C. Ma 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
H. Maeda 40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
T. N. Maksimkina 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
R. Malchow τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

- 193
- M. Mandelkern** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- L. K. Mangotra** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- H. Marsiske** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- N. A. Marutyan** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- Masako Iwamoto** 40MeV/u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
- N. V. Maslennikova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- K. Matsuda** 10.6MeV/u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶巍等 12 人 21(1997)1
- B. J. Min** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- S. Mitarai** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- I. S. Mittra** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich

- 等 109 人 19(1995)703
- K. Mizitani** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- S. Mokerjee** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- C. B. Moon** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- K. Morida** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- T. Morikawa** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- K. Morita** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- T. Murakami** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- J. Musulmanbekov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

N

- M. Nagajima** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- K. Nagata** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- T. Nakagawa** 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶巍等 12 人 21(1997)1
- 用动力学模型计算 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr}(^{27}\text{Al}, \text{准裂变})$ 反应的裂变时间 叶巍等 6 人 21(1997)348
- M. Nakajima** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- H. Nanjo** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- S. Z. Nasyrov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

- J. B. Natowitz** 对称多重裂变的形变位势垒及其对核温度的依赖性 戴光曦等 6 人
19(1995)447
- V. S. Navotny** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- M. Nishizawa** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55
人 17(1993)385
- O**
- M. Ochs** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- A. Odahara** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- M. Ogawa** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人
20(1996)385
 ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- Y. Ohkubo** 135MeV / u ^{12}C 和铁相互作用中靶余核的质量分布 秦 芝等 11 人 19(1995)
481
- M. Ohnishi** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55
人 17(1993)385
- I. Ohta** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55
人 17(1993)385
- H. Okuno** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- S. L. Olsen** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)
385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人
21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
193
- G. I. Orlova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人

- 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- Osamu Miyamura** 玻色-爱因斯坦关联半径和源半径对实验窗口的依赖及它们的差异 陆中道等 4 人 21(1997)458
- M. Oshima** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- I. Otterlund** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- J. Oyang** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- P**
- H. S. Palsania** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- D. Paluselli** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- L. J. Pan** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385

- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- J. Panetta** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- N. G. Peresadko** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- N. V. Petrov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- V. A. Plyushchev** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- M. Pohl** L3 中心径迹室顶点位置分辨的改进 杨长根等 5 人 18(1994)687
- L3 实验测量 τ 寿命的拟合方法及其误差讨论 杨长根等 5 人 18(1994)794
- F. Porter** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481

- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- F. Prabhakar** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- Q**
- J. Quigely** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- R**
- A. V. Ramayya** ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)104
- R. Raniwala** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- S. Raniwala** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

- N. K. Rao** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- V. M. Rappoport** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- J. O. Rasmussen** 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)
104
- J. Ravina** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- J. T. Rhee** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- P. Ring** 推转相对论平均场方法中超形变核的全同带 朱志远等 3 人 20(1996)448
- M. Roeser** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- P. Roussel Chomaz** 95MeV / u 的 ^{12}C 炮弹产生的二次束流强度研究 杨永锋等 3 人 19(1995)980

S

- N. Saidkhanov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- M. Sakata** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55
人 17(1993)385

- N. A. Salmanova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- L. G. Sarkisova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- V. R. Sarkisyan** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- To. Satio** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- H. Sato** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- M. Schernau** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- B. Schmid** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- J. Schultz** 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{\mp} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97

- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- G. S. Shabratova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- T. I. Shakhova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- T. J. Shank** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- Y. Shao** 2π 干涉学中的多 π 关联 张卫宁等 9 人 17(1993)49
 π 介子的非对称发射与核媒质态方程 王 山等 8 人 17(1993)725
 碰撞 1.2A GeV Ar + KCl 中的 n 粒子横向关联与集体性 刘庆军等 9 人 17(1993)912
- X. R. Shi** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- M. Shibata** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
 ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- Shin Muroya** 玻色-爱因斯坦关联半径和源半径对实验窗口的依赖及它们的差异 陆中道等 4 人 21(1997)458
- H. Shipman** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^\pm\nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+\pi^-J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人

- 20(1996)97
- T. Shirai** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- Shizuko Ambe** 40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
- S. N. Shpilev** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- J. Shultz** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- R. H. Siemssen** 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283
- 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
- D. Skelding** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- A. Smerzi** 双核系统预平衡偶极巨共振 钟纪泉等 8 人 19(1995)1114
- A. Smith** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- E. Soderstorm** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- K. Soderstrom** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289

- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- Z. I. Solovjeva** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- S. P. Sorensen** 相对论重离子碰撞中有限碰撞时间对能量密度的影响 赵维勤等 2 人
17(1993)476
- J. Standifird** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
193
- E. Stenlund** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich
等 109 人 19(1995)703
- D. Stoker** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}\pi^{\pm}\nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+}\pi^{-}J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人
20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)
193
- M. A. Stoyer** 丰中子核 ^{141}Xe 、 ^{152}Ce 、 ^{153}Nd 及 ^{160}Sm 能级图的建立 朱胜江等 11 人 21(1997)
104
- S. C. Strausz** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人
18(1994)884

- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- M. Sugawara 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385
- ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- H. Sugimoto 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- E. Suraud 高能质子发射和冷原子核多重碎裂类型 张丰收等 3 人 21(1997)523
- E. L. Surin 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- L. N. Svechnikova 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
- 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
- BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- J. Synodinos τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
- $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193

T

- K. Taira 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- N. Tateyama 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- W. Toki τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
- $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
- 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
- D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
- $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
- 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
- $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89

- $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- K. D. Tolstov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- S. Torii** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- E. Torrence** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} \pi^{-} \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^{*}$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- M. Tothova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- M. I. Tretyakova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- T. P. Trofimova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- U. I. Tuleeva** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

- B. P. Tursunov** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

U

- H. Ueno** 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778

V

- S. Vokal** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- J. Vrlakova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703

W

- R. Wada** 对称多重裂变的形变位势垒及其对核温度的依赖性 戴光曦等 6 人 19(1995)447
- S. Whittaker** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- R. J. Wilkes** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- H. W. Wilschut** $294\text{MeV } ^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应中出射 α 粒子的研究 谢元祥等 9 人 17(1993)283

- 294MeV $^{20}\text{Ne} + ^{159}\text{Tb}$ 反应发射中等质量碎片的研究 谢元祥等 10 人 18(1994)982
- R. Wilson** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- W. J. Wisniewski** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- J. L. Wood** ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- X**
- B. Xiao** 对称多重裂变的形变位势垒及其对核温度的依赖性 戴光曦等 6 人 19(1995)447
- Y**
- R. Yamamoto** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^{\pm} \nu_{\tau}$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^{\pm} \rightarrow \pi^{\pm} + n\pi^0 + \nu_{\tau} (n = 0, 1, 2)$ 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- Y. Yamamoto** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385
- A. Yoshida** 奇-奇核 ^{144}Pm 高自旋同质异能态及其衰变纲图的研究 张玉虎等 20 人 20(1996)385

- 丰中子核素 ^{14}B 和 ^{15}B 的电四极矩测量 刘冠华等 13 人 20(1996)778
- K. Yoshida** 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶巍等 12 人 21(1997)1
- Yoshio Kobayashi** 40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
- A. Yoshita** ^{146}Sm 核高自旋态的实验观测 张玉虎等 21 人 21(1997)110
- Yoshitaka Ohkubo** 40MeV / u ^{40}Ar 与 Cu 相互作用的靶余核 尹新民等 10 人 19(1995)991
- K. Young** D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193
- K. Yuasa-Nakagawa** 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr} + ^{27}\text{Al}$ 碰撞中粒子发射的方位角分布和方位角关联 叶巍等 12 人 21(1997)1
 用动力学模型计算 10.6MeV / u $^{84}\text{Kr}(^{27}\text{Al}, \text{准裂变})$ 反应的裂变时间 叶巍等 6 人 21(1997)348
- T. Yuda** 西藏羊八井广延空气簇射阵列性能的 Monte Carlo 研究 M. Amenomori 等 55 人 17(1993)385

Z

- E. F. Zganjar** ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- X. Zhao** ^{187}Au 的能级结构及单质子与偶-偶核芯的耦合特性 朱胜江等 9 人 18(1994)193
- S. I. Zhochova** 高能诱发核反应中粒子产生的相对信息熵 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)289
 高能重离子中心碰撞末态多重数谱的局域特征 M. I. Adamovich 等 109 人 18(1994)884
 BNL / AGS 10.7A GeV 金核诱发作用中核碎裂与粒子产生 M. I. Adamovich 等 109 人 19(1995)703
- G. Zioulas** τ 轻子质量的精密测量 丁慧良等 199 人 19(1995)97
 $\sqrt{s} = 4.03\text{GeV}$ 下 $\tau^\pm \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^\pm \nu_\tau$ 衰变的测量 白景芝等 201 人 19(1995)385
 由 $\psi(2S) \rightarrow \pi^+ \pi^- J/\psi$ 道测量 J/ψ 轻子道衰变分支比 白景芝等 187 人 20(1996)97
 D_s 衰变常数的测量 白景芝等 193 人 20(1996)193
 $\psi(2S) \rightarrow \rho\pi$ 及 $\psi(2S) \rightarrow K\bar{K}^*$ 衰变的研究 白景芝等 195 人 20(1996)481
 粲夸克偶素 P 波态 χ_{c0} 宽度测量 白景芝等 198 人 20(1996)1057
 $\psi(2S)$ 强衰变中矢量-张量介子末态的反常压制 白景芝等 198 人 21(1997)89
 $\tau^\pm \rightarrow \pi^\pm + n\pi^0 + \nu_\tau$ ($n = 0, 1, 2$) 衰变分支比测量 白景芝等 205 人 21(1997)193